



# Ranitidin intravenös inj 1 mg/mL

(ex Zantac)

## EN-STEGSSPÄDNING

Ranitidin (ex Zantac) 25 mg/mL 1 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 24 mL	=	INJ LÖ <b>1 mg/mL</b> 25 mL
---	---	--	---	-----------------------------------

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion/infusion: Minst 5 min, max 10 mg/min.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Ranitidin (ex Zantac) (registrerad produkt)

1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 24 tim kylskåp, 12 tim rumstemperatur.

25 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Får ej sparas pga förväxlingsrisk.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Gastroesofagal refluxsjukdom (GERD),

### GI-blödning och stress - Profylax

Nyfödda (prematura): 0,5 (- 1,5) mg/kg x 2

Nyfödda (från vecka 37): (0,5 -) 1,5 mg/kg x 3 - 4

Barn 1 mån - 18 år: 0,5 - 2 mg/kg x 3 - 4, max 50 mg/dos eller 300 mg/dygn.

Reducera dosen vid nedsatt njurfunktion (GFR under 50 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>).

## RIMLIG DOS FÖR 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1,5 mg/kg	1,5 mL	7,5 mL	15 mL	-
2 mg/kg	-	-	20 mL	-
Max 50 mg/dos	-	-	-	50 mL

## REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-11-05

ePedID: 1194

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-11-05

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-11-05

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**