



## Lidokain intravenös inf 20 mg/mL

(ex Xylocard)

**EKG-övervakning krävs. Risk för arytm och/eller hypotension.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Injektion/infusionslösningar med lidokain UTAN konserveringsmedel:  
Lidocaine Accord 20 mg/mL  
Lidokain Ebb 20 mg/mL  
Xylocard 20 mg/mL

Behöver ej spädas.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös bolus:  
Laddningsdos vid kramper ges under 10 min.  
Laddningsdos vid arytm ges under 3 - 5 min.

Intravenös infusion (kontinuerlig):

.....  
Lidokain kan även ges intraosseöst.

### RIMLIG DOS för Lidokain intravenös inf 20 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mg/kg	0,02 mL	0,12 mL	0,25 mL	1,25 mL
2 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL	-	-
2 mg/kg/TIM	0,1 mL/tim	0,5 mL/tim	-	-
6 mg/kg/TIM	0,3 mL/tim	1,5 mL/tim	-	-
20 MIKROG/kg/MIN	0,06 mL/tim	0,3 mL/tim	0,6 mL/tim	3 mL/tim
70 MIKROG/kg/MIN	0,21 mL/tim	1,05 mL/tim	2,1 mL/tim	10,5 mL/tim

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Obs! Indikationerna nedan har OLIKA DOSERINGSENHETER.

#### Kramper hos nyfödda

Laddningsdos: 2 mg/kg  
Underhållsdos: (2 -) 4 - 6 mg/kg/TIM

Behandlingen bör avslutas inom 48 timmar genom stegvis nedtrappning. Längre behandlingstid medför risk för ackumulering av prokonvulsiva metaboliter som vid utsättning kan ge upphov till nya anfall.

#### Ventrikulär arytm

Nyfödda:  
Laddningsdos: 0,5 - 1 mg/kg  
Därefter kontinuerlig infusion 20 - 70 MIKROG/kg/MIN

Barn 1 mån - 18 år:  
Laddningsdos: 0,5 - 1 mg/kg, max 100 mg/DOS  
Därefter kontinuerlig infusion 20 - 70 MIKROG/kg/MIN

Om infusionen inte kan startas inom 15 min efter laddningsdosen kan upprepade laddningsdoser ges med minst 5 minuters intervall tills infusionen startas, dock max under 1 tim: 3 mg/kg, max 300 mg.

### ÖVRIG INFORMATION

Lidokain bör inte kombineras med fosfentoin/fentyoin pga ökad risk för arytmier och hypotension.

Försiktighet vid nedsatt lever- eller njurfunktion då det finns risk för ackumulering och toxiska effekter vid upprepade behandling. Lidokain metaboliseras i levern och de aktiva metaboliterna utsöndras via njurarna. Metaboliterna har mindre uttalad antiarytmisk effekt än lidokain.





## Lidokain intravenös inf 20 mg/mL

(ex Xylocard)

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Lidokain utan kons. (registrerad produkt)

20 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Sparas ej efter första uttag.  
Efter iordningställande: 12 tim i rumstemp. Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enl SLS, se ref Hållbarhetsinformation.

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Micromedex

NeoFax

Neonatal Formulary

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Kramper

<http://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-varprogram/>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#1196](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1196)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-10-04

ePedID: 1196

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-10-08

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-10-08

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**