

Lidokain utvärtes gel 2 %

(Xylocain)

OBS Flera styrkor och administreringsätt finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

Administreringsätt

Lokalt

Vanlig indikation och dos

Behov av lokal smärtlindring

Under 12 år: Max 0,3 ml/kg = (6 mg lidokain/kg) på tubspets eller urinkateter. Ge inte mer än fyra doser på ett dygn.

Hållbarhet preparat:

Xylocain (Registrerad Produkt)

● 2 %, Gel

Hållbar: Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas. Den okonserverade produkten är för engångsbruk. Om tuben innehåller konserveringsmedel gäller att vid höga hygienkrav bör tuben användas max 7 dagar till flera patienter och max 21 dagar till enskild patient.

Övrig information

Tuben innehåller konserveringsmedel.
Engångssprutorna är okonserverade.

Referens/Länk

FASS , Hämtat: 2016-05-26

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 1B), Hämtat: 2016-05-26

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Lidocaine, N01BB02

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2016-05-26 16:34:07
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-06-08 12:51:26
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1199
ID/spårnummer: 1259
Giltig fr o m: 2016-06-08 12:51:26
Utskriftsdatum: 2016-06-08

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

