



Lidokain utvärtes gel 2 %

(Xylocain)

ADMINISTRERING

Lokalt. Kan appliceras via medföljande sprutspets eller urinkateter.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Xylocain (registrerad produkt)

2 %, Gel

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas. Förfyllda sprutor är okonserverade, sparas ej. Tuben innehåller konserveringsmedel, hållbar max 7 dagar till flera patienter och max 21 dagar till enskild patient.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behov av lokal smärtlindring

Individuell dosering. Vid val av dos, beakta längden på uretra, kroppsvikt och procedur. Effekt uppnås inom ca 5 min, effektiv ytanestesi kvarstår ca 20 - 30 min.

Nyfödda: Max 0,3 mL/kg = max 6 mg lidokain/kg. Max 4 gånger/DYGN.

Barn 1 månad - 12 år: Max 0,3 mL/kg = max 6 mg lidokain/kg. Max 4 gånger/DYGN.

Barn från 13 år: Brist på riktvärden för barn över 12 år. Max 0,3 mL/kg = max 6 mg lidokain/kg. Beakta även riktvärden för vuxen: 20 mL för manlig uretra, 5 - 10 mL för kvinnlig uretra. Max 4 gånger/DYGN.

ÖVRIG INFORMATION

1 mL = 1 gram gel innehåller 20 mg lidokainhydroklorid.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Neonatal Formulary

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll 2021-10-14

ePedID: 1199

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-10-14

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-10-12

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN Kopia ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT