

## **Nevirapin oralt 10 mg/mL** (Viramune) oral suspension

Nevirapin kan orsaka svår leverskada, svåra hudreaktioner och/eller överkänslighetsreaktioner.

---

### Administreringsätt

Oralt  
Enteralt i sond

---

### Vanlig indikation och dos

#### **Postexpositionsprofylax mot HIV-infektion i samband med födelse, vid behov av förstärkt behandling**

Nyfödda: 2 mg/kg som engångsdos vid 48 - 72 timmars ålder

Om modern inte hunnit få nevirapin senast 2 timmar före förlossningen ges dessutom en extra dos om 2 mg/kg till barnet omedelbart efter födseln.

Som del i profylaktisk kombinationsbehandling:

Behandlingsdag 1 - 7: 2 mg/kg x 1

Behandlingsdag 8 - 14: 4 mg/kg x 1

När nevirapin ges som del i kombinationsbehandling kan administreringen påbörjas samtidigt som övriga preparat. Nevirapin ges i 2 veckor, övriga preparat i 4 veckor.

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-06-19 15:52:00  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-20 15:51:33  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1201  
ID/spårnummer: 3403  
Giltig fr o m: 2017-06-20 15:51:33  
Utskriftsdatum: 2017-06-20

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Nevirapin oralt 10 mg/mL (Viramune) oral suspension

### Behandling av HIV-infektion

Nyfödda - 2 mån:

Initialt 5 mg/kg x 1 eller 120 mg/m<sup>2</sup> x 1 i 14 dagar,  
sedan 5 mg/kg x 2 eller 120 mg/m<sup>2</sup> x 2 i 14 dagar. Därefter 200 mg/m<sup>2</sup> x 2.

Barn 2 mån - 8 år:

Initialt 120 mg/m<sup>2</sup> x 1, max 200 mg/dos, i 14 dagar.  
Om inte hudutslag eller andra oönskade bieffekter uppkommer ökas dosen till 7 mg/kg x 2 eller 200 mg/m<sup>2</sup> x 2, max 200 mg x 2.

Barn över 8 år:

Initialt 120 mg/m<sup>2</sup> x 1, max 200 mg/dos, i 14 dagar.  
Om inte hudutslag eller andra oönskade bieffekter uppkommer ökas dosen till 4 mg/kg x 2 eller 120 mg/m<sup>2</sup> x 2, max 200 mg x 2.

Om hudutslag uppkommer under den första insättningsperioden på 14 dagar ska dosen inte ökas förrän utslagen försvunnit. Om utslagen inte försvunnit inom 28 dagar ska en alternativ behandling sättas in.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mg/kg	0,2 mL	1 mL		
4 mg/kg		2 mL	4 mL	20 mL
7 mg/kg		3,5 mL	7 mL	
Max 200 mg				20 mL

### Hållbarhet preparat:

Viramune (registrerad produkt)

10 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: Öppnad flaska är hållbar 6 månader.

### Övrig information

Nevirapin är i första hand ett NNRTI-alternativ till barn under 3 år. För barn över 3 år har efavirenz visat sig vara effektivare.

Risken för svåra hudreaktioner, inklusive bl.a. Stevens-Johnsons syndrom, och allvarlig hepatit/leversvikt är störst under de första 6 behandlingsveckorna, men kan även komma senare. Patienten bör monitoreras noggrant under de första 18 veckorna. Behandlingen måste avbrytas, och inte återinsättas, om patienten får svåra hudutslag, hudutslag med allmänpåverkan, andra svåra överkänslighetsreaktioner eller allvarlig leverpåverkan.

Suspensionen innehåller metylparahydroxibensoat och

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-06-19 15:52:00  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-20 15:51:33  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1201  
ID/spårnummer: 3403  
Giltig fr o m: 2017-06-20 15:51:33  
Utskriftsdatum: 2017-06-20

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Nevirapin oralt 10 mg/mL

## (Viramune) oral suspension

propylparahydroxibensoat.

---

### Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAV, Antiretroviral behandling av HIV-infektion

<http://www.sls.se/RAV/Rekommendationer/HIV>

Internetadress RAV, Profylax och behandling vid graviditet hos HIV-1 infekterade kvinnor

<http://www.sls.se/RAV/Rekommendationer/HIV>

Micromedex

NeoFax

Rekommendation ,(Grade 1B)

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjonet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#1201](http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1201)

---

### Substansspecifika uppgifter

Nevirapine, J05AG01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceld=IDE4POGVUB79YVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-06-19 15:52:00  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-20 15:51:33  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1201  
ID/spårnummer: 3403  
Giltig fr o m: 2017-06-20 15:51:33  
Utskriftsdatum: 2017-06-20

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

