

## Spironolakton oralt (ex Extempore)

---

**Instruktionen gäller för:** Spironolakton tablett 25, 50 och 100 mg (ex Spironolakton Takeda) samt Extemporeberedd spironolakton kapsel 5 mg

---

### Administreringsätt

Oralt: Spironolakton bör ges i samband med måltid.

Vid sväljsvårigheter kan extemporeberedda kapslar öppnas. Innehållet i kapslarna kan blandas med mat. För Spironolactone Accord anges att tablett kan krossas och slamas upp i ett glas vatten. För övriga preparat saknas information av detta slag. Handskar ska användas när tabletter/kapslar hanteras på detta vis.

-----  
Enteralt i sond: Använd i första hand oral lösning, se annan instruktion.

Enligt brittisk litteratur kan spironolakton tablett administreras via 8 Fr nasogastrisk sond. För att göra detta ska tablett krossas, slamas upp i vatten och skakas i 2 - 5 min. Detta gäller ej filmdragerad tablett, då filmdragering kan fastna i sond.

Delmängder ska INTE ges eftersom spironolakton är olösligt i vatten. Vid uppslamning blir lösningen inte homogen.

---

### Vanlig indikation och dos

#### Behov av kaliumsparande diuretika

Nyfödda: 0,5 - 1 (- 3) mg/kg x 1 - 2. Max 3,3 mg/kg/dygn, 100 mg/dygn.

Barn 1 mån - 12 år: 0,5 - 1 (- 3) mg/kg x 1 - 2. Max 3,3 mg/kg/dygn, 200 mg/dygn.

Barn 12 - 18 år: 25 - 50 (- 100) mg x 1 - 2. Max 200 mg/dos, 400 mg/dygn.

#### Nefrotiskt syndrom

Barn över 1 mån: 2 - 3 mg/kg x 1

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-10-26 10:25:27

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-11-09 12:27:26

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1218

ID/spårnummer: 3875

Giltig fr o m: 2017-11-09 12:27:26

Utskriftsdatum: 2017-11-14

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Spironolakton oralt

## (ex Extempore)

### Ödem vid hjärtsvikt och ascites

Nyfödda: 0,5 - 1 (- 2) mg/kg x 1 - 2. Max 7 mg/kg/dygn.

Barn 1 mån - 12 år: 0,5 - 1 (- 3) mg/kg x 1 - 2. Max 9 mg/kg/dygn, max 400 mg/dos.

Barn 12 - 18 år: 25 - 50 (- 100) mg x 1 - 2. Max 9 mg/kg/dygn, max 400 mg/dos.

---

### Hållbarhet preparat:

Spironolakton (extempore - ej lagervara)

- 5 mg, Kapsel, hård

Hållbar: Förvaras vid högst 30°C. Hållbar 6 mån.

- 25 mg, Tablett

Hållbar: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt anges för Spironolactone Accord men för övriga preparat anges inte denna information. Gäller för tablett 25, 50 och 100 mg.

---

### Övrig information

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion, pga risk för hyperkalemi.

---

### Referens/Länk

APL databas (AIDA) APL databas (AIDA)

<https://www.apl.se/Sv/vard/extempore/>

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress Svensk Barnnefrologisk Förening, Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

Internetadress Svensk Barnnefrologisk Förening, Nefrotiskt syndrom

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2C)

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### Substansspecifika uppgifter

Spironolactone, C03DA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POBSU90HDVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-10-26 10:25:27

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-11-09 12:27:26

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1218

ID/spårnummer: 3875

Giltig fr o m: 2017-11-09 12:27:26

Utskriftsdatum: 2017-11-14

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

