



Sotalol oralt 10 mg/mL

(Extempore) oral lösning

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

RIMLIG DOS för Sotalol oralt 10 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mg/kg	0,05 ml	0,25 ml	0,5 ml	2,5 ml
1 mg/kg	0,1 ml	0,5 ml	1 ml	5 ml
4 mg/kg	0,4 ml	2 ml	4 ml	20 ml

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Sotalolhydroklorid (extempore - ej lagervara)

10 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ventrikulär arytm samt svårbehandlad supraventrikulär arytm

Ordineras i samråd med barnkardiolog.

Nyfödda: 0,5 - 1 mg/kg x 2 - 3, ev. successiv ökning var 3 - 4:e dag upp till 4 mg/kg x 2

Barn 1 mån - 18 år: 1 mg/kg x 2, ev successiv ökning var 3 - 4:e dag upp till 4 mg/kg x 2

Maxdos barn 1 mån - 11 år: 80 mg x 2

Maxdos barn 12 - 18 år: 160 mg x 2

ÖVRIG INFORMATION

Hypokalemi eller hypomagnesi måste korrigeras innan behandling med sotalol, annars finns ökad risk för förstärkt QT-förlängning och torsade de pointes.

Sotalol bör sättas in när patienten är inneliggande med daglig EKG- kontroll. Oftas krävs kontinuerlig EKG-övervakning.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2019-03-19

ePedID: 1219

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-04-16

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-04-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT