

## SOLU-CORTEF, IV inj (Obs 2 steg)

## hydrokortison 5 mg/ml

enl spädn-instruktion

	<i>inj subst</i>			<i>stamlösning</i>
<b>steg 1</b>	100 mg		medföljande vätska	50 mg/ml
	pulver	+	2 ml	= 2 ml
	<i>stamlösning</i>			<i>IV inj</i>
<b>steg 2</b>	50 mg/ml		glukos 50 mg/ml	5 mg/ml
	1 ml	+	9 ml	= 10 ml

Beredningsinstruktion: För beredning av stamlösning: Tryck ovanifrån hårt på plasthatten så att lösningsmedlet rinner ner i nedre flaskdelen. Skaka förpackningen tills innehållet är upplöst.

Administrering: 3-5 min

Hållbarhet efter iordningställande: Färdigspädd lösning hållbar 12 tim. Stamlösningen får pga risk för förväxling inte sparas.

Hållbarhet originalförp: Förvaras i originalförpackningen (fuktkänsligt).

Varunummer: 161125, Solu-Cortef injsubs I+II 100mg, 100 mg

Källa: FASS

Indikation: 1) Binjurebarksvikt; 2) Assistera extubation vid BPD; 3) Hypoglykemi 4) Septisk shock

Vanlig dos: 1) 20-40 mg/kvm kroppsyta x 3 (motsv c:a 5-25 mg/kg x 3); 2) 2,5 mg/kg x 2; 3) 1,25 mg/kg x 4; 4) 1-2 mg/kg bolus

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för hydrokortison 5 mg/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
1 mg/kg (bolus septisk chock)	0,10 ml	0,20 ml	0,40 ml	0,60 ml
2 mg/kg (bolus septisk chock)	0,20 ml	0,40 ml	0,80 ml	1,20 ml