

Salicylsyra utvärtes 1 % (Salsyvase) salva

Administreringsätt

Kutant

Vanlig indikation och dos

Behandling av seborroisk dermatit (mjölkskorv, gnejs) i hårbotten på spädbarn

Smörj på ett tunt lager salva, låt sitta i 3 - 4 timmar. Använd sedan finkam och kamma bort salvan och skorven. Resterande salva kan tvättas bort med mildt schampo, schamponeringen kan upprepas tills salvesterna är borta.

Behandlingen kan upprepas vid behov.

Hållbarhet preparat:

Salsyvase (registrerad produkt)

1 %, Salva

Hållbar: Öppnad tub bör användas max 7 dagar till flera patienter och max 28 dagar till enskild patient.

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

salicylic, D02AF

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POBXU93NFVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-05-10 10:30:31
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-05-10 10:30:27
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1225
ID/spårnummer: 3202
Giltig fr o m: 2017-05-10 10:30:27
Utskriftsdatum: 2017-05-10

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

