

CEFTRIAXON STRAGEN, IV inj

ceftriaxon 100 mg/ml

enl spädn-instruktion

<i>inj subst</i>			<i>IV inj</i>
1000 mg		sterilt vatten	100 mg/ml
pulver	+	9,6 ml	= 10 ml

Beredningsinstruktion: Ceftriaxon ACS Dobutar Generics är synonympreparat till Ceftriaxon Stragen och kan användas om inte Ceftriaxon Stragen finns hemma.

Administrering: Injektion 2-4 min.

OBS.

-Ges över 60 minuter om doser över 50 mg/kg

-Ges över 60 minuter eller avstå behandling med ceftriaxon om barnet har höga nivåer av okonjugerat bilirubin.

-Med anledning av risk för utfällning:

För barn <28 levnadsdagar, vänta 48 tim före eller efter inf/inj med kalcium (gäller även vid separata infarter).

För barn >28 levnadsdagar spola ordentligt mellan varje infusion av kalcium och ceftriaxone.

Hållbarhet efter iordningställande: 6 tim i rt, 24 tim i kyl

Hållbarhet originalförp: Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Varunummer: 25022, Ceftriaxon Stragen pu inj 1g, 10 x 1 g

Källa: FASS

Obs: Allergent läkemedel, hanteras enligt neo läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation: Systemisk bakteriell infektion

Vanlig dos: 50-75 (-100) mg/kg x 1. Dos beroende av gestationsålder och postnatal ålder.

**Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för
ceftriaxon 100 mg/ml**

Vanlig dos	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
50 mg/kg	0,25 ml	0,50 ml	1,00 ml	1,50 ml
100 mg/kg	0,50 ml	1,00 ml	2,00 ml	3,00 ml
