

RETROVIR, IV inf
zidovudin 4 mg/ml
enl spädn-instruktion

OBS Flera styrkor och administreringsätt finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

<i>inf konc</i>			<i>IV inf</i>
10 mg/ml		glukos 50 mg/ml	4 mg/ml
4 ml	+	6 ml	= 10 ml

Administrering: 30 minuter för nyfödda (för övrig population rekommenderas 60 minuter).

Hållbarhet efter iordningställande: 12 tim i rt, 24 tim i kyl
Hållbarhet originalförp: Förvaras vid högst 30 C i ytterkartongen.

Varunummer: 560987, Retrovir infkonc 10mg/ml, 5 x 20 ml

Källa: FASS

Obs: Allergent läkemedel, hanteras enligt neo läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation: Behandling och förebyggande av HIV-infektion

Vanlig dos: 1,5 mg/kg/dos. Dosintervall 6-12 tim beroende av gestationsålder och postnatal ålder.

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för zidovudin 4 mg/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
1,5 mg/kg/dos	0,19 ml	0,38 ml	0,75 ml	1,13 ml