



Zidovudin oralt 10 mg/mL

(Retrovir) oral lösning

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

RIMLIG DOS för Zidovudin oralt 10 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mg/kg	0,2 mL	-	-	-
3 mg/kg	0,3 mL	-	-	-
9 mg/kg	-	-	9 mL	-
12 mg/kg	-	6 mL	-	-

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Zidovudin (registrerad produkt)

10 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvara flaskan i ytterkartongen. Öppnad flaska hållbar 1 månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Postexpositionsprofylax mot HIV-infektion i samband med födelse

Gestationsvecka vid födsel mindre än vecka 30:

2 mg/kg x 2

Gestationsvecka vid födsel vecka 30 - 34:

Behandlingsdag 1 - 14: 2 mg/kg x 2

Behandlingsdag 15 - 28: 3 mg/kg x 2

Gestationsvecka vid födsel från vecka 35:

4 mg/kg x 2

Behandlingen ska påbörjas inom 4 timmar efter födseln.

Behandlingstid: 4 veckor

Behandling av HIV-infektion

Gestationsvecka vid födsel mindre än vecka 30:

2 mg/kg x 2 i 4 veckor, sedan 3 mg/kg x 2 till 8 - 10 veckors postnatal ålder, därefter 12 mg/kg x 2

Gestationsvecka vid födsel vecka 30 - 34:

2 mg/kg x 2 i 2 veckor, sedan 3 mg/kg x 2 till 6 - 8 veckors postnatal ålder, därefter 12 mg/kg x 2

Gestationsvecka vid födsel från vecka 35:

4 mg/kg x 2 i 4 veckor, sedan 12 mg/kg x 2

Barn 4 - 9 kg: 12 mg/kg x 2

Barn 9 - 30 kg: 9 mg/kg x 2

Barn över 30 kg: 300 mg x 2



Zidovudin oralt 10 mg/mL

(Retrovir) oral lösning



ÖVRIG INFORMATION

Zidovudin är kontraindicerat till nyfödda med hyperbilirubinemi som kräver annan behandling än ljusbehandling och till nyfödda som har transaminasvärden mer än 5 gånger övre gränsen för normalvärdet.

Zidovudin används som monoterapi i normalfallet av postexpositionsprofylax vid födelse, när det inte finns behov av förstärkt behandling.

Zidovudin + lamivudin är en alternativ kombination till barn i alla åldrar om andra NRTI-preparat inte är lämpliga, men zidovudin bör undvikas så långt det är möjligt pga ogynnsamma biverkningar, bl.a. lipoatrofi.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress INFPREG - Kunskapscentrum för infektioner under graviditet

<http://www.medscinet.se/infpreg/>

Internetadress RAV, Referensgruppen för antiviral terapi - Antiretroviral behandling av HIV-infektion

<http://www.sls.se/RAV/Rekommendationer/HIV>

Internetadress RAV, Referensgruppen för antiviral terapi - Profylax och behandling vid graviditet hos HIV-1 infekterade kvinnor

<http://www.sls.se/RAV/Rekommendationer/HIV>

Micromedex

NeoFax

Rekommendation (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1230



Zidovudin oralt 10 mg/mL

(Retrovir) oral lösning



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-09-18

ePedID: 1230

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-09-18

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-09-18

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT