

Zidovudin oralt 10 mg/mL

(Retrovir) oral lösning

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner,
Skyddsinformation saknas i FASS

Administreringsätt

Oralt
Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos

Postexpositionsprofilax mot HIV-infektion i samband med födelse

Gestationsvecka vid födsel mindre än vecka 30:

2 mg/kg x 2

Gestationsvecka vid födsel vecka 30 - 34:

Behandlingsdag 1 - 14: 2 mg/kg x 2

Behandlingsdag 15 - 28: 3 mg/kg x 2

Gestationsvecka vid födsel från vecka 35:

4 mg/kg x 2

Behandlingen ska påbörjas inom 4 timmar efter födseln.

Behandlingstid: 4 veckor

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-06-20 09:37:38
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-21 10:54:30
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1230
ID/spårnummer: 3413
Giltig fr o m: 2017-06-21 10:54:30
Utskriftsdatum: 2017-06-21

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Zidovudin oralt 10 mg/mL

(Retrovir) oral lösning

Behandling av HIV-infektion

Gestationsvecka vid födsel mindre än vecka 30:

2 mg/kg x 2 i 4 veckor, sedan 3 mg/kg x 2 till 8 - 10 veckors postnatal ålder, därefter 12 mg/kg x 2

Gestationsvecka vid födsel vecka 30 - 34:

2 mg/kg x 2 i 2 veckor, sedan 3 mg/kg x 2 till 6 - 8 veckors postnatal ålder, därefter 12 mg/kg x 2

Gestationsvecka vid födsel från vecka 35:

4 mg/kg x 2 i 4 veckor, sedan 12 mg/kg x 2

Barn 4 - 9 kg: 12 mg/kg x 2

Barn 9 - 30 kg: 9 mg/kg x 2

Barn över 30 kg: 300 mg x 2

Vuxendos (300 mg x 2) kan ges från 12 år.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mg/kg	0,2 mL			
3 mg/kg	0,3 mL			
9 mg/kg			9 mL	
12 mg/kg		6 mL		

Hållbarhet preparat:

Zidovudin (registrerad produkt)

10 mg/mL, Oral lösning

Hållbar: Förvara flaskan i ytterkartongen. Öppnad flaska hållbar 1 månad.
Förvaras vid högst 30 °C.

Övrig information

Zidovudin är kontraindicerat till nyfödda med hyperbilirubinemi som kräver annan behandling än ljusbehandling och till nyfödda som har transaminasvärden mer än 5 gånger övre gränsen för normalvärdet.

Zidovudin används som monoterapi i normalfallet av postexpositionsprofylax vid födelse, när det inte finns behov av förstärkt behandling.

Zidovudin + lamivudin är en alternativ kombination till barn i alla åldrar om andra NRTI-preparat inte är lämpliga, men zidovudin bör undvikas så långt det är möjligt pga ogynnsamma biverkningar, bl.a. lipoatrofi.

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-06-20 09:37:38

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-21 10:54:30

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1230

ID/spårnummer: 3413

Giltig fr o m: 2017-06-21 10:54:30

Utskriftsdatum: 2017-06-21

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Zidovudin oralt 10 mg/mL

(Retrovir) oral lösning

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress INFPREG

<http://www.medsinet.se/infpreg/>

Internetadress RAV, Antiretroviral behandling av HIV-infektion

<http://www.sls.se/RAV/Rekommendationer/HIV>

Internetadress RAV, Profylax och behandling vid graviditet hos HIV-1 infekterade kvinnor

<http://www.sls.se/RAV/Rekommendationer/HIV>

Micromedex

NeoFax

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1230

Substansspecifika uppgifter

Zidovudine, J05AF01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POEUUAIS1VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-06-20 09:37:38
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-21 10:54:30
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1230
ID/spårnummer: 3413
Giltig fr o m: 2017-06-21 10:54:30
Utskriftsdatum: 2017-06-21

Kontrollera alltid att utskrivna kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

