

Paracetamol/Perfalgan IV inf 10 mg/ml

Paracetamol

Dosreduktion med 25% efter 3 dygn.

Behöver ej spädas. Barnets dos kan spädas vidare med 0,9% natriumkloridlösning eller 5% glukoslösning ned till en tiondel. I sådana fall, ska den utspädda lösningen användas inom en timme efter spädning (inklusive infusionstiden). Möjligheten till spädning gäller inte enheter där vätskebalansen räknas utifrån ordinerad volym ex. Neo.

Hållbarhet preparat:

Paracetamol Fresenius Kabi/Perfalgan (Registrerad Produkt)

- 10 mg/mL, Infusionsvätska, lösning, Hållbar: Sparas högst 6 tim i rumstemperatur eller 24 tim i kyl efter första uttag. Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas.

Administreringsätt

Ges som intravenös infusion under 15 minuter.

Vanlig indikation och dos

Neo: Smärta

Obs! Dosreduktion med 25% efter 3 dygn.

28 - 32 veckor: 7,5 mg/kg x 3

33 - 36 veckor: 7,5 mg/kg x 4

över 36 veckor: 10 - 15 mg/kg x 4

Barn: Smärta, när andra administreringsvägar inte är möjliga.

Barn 0 - 2 mån: 10 - 15 mg/kg x 4

Barn äldre än 2 mån: 15 - 20 mg/kg x 4

Maxdos barn under 33 kg: 2 g/dygn

Maxdos barn under 50 kg: 3 g/dygn

Maxdos barn över 50 kg: 4 g/dygn

Överväg laddningsdos (20 mg/kg till fullgångna nyfödda, 30 mg/kg barn över 2 mån).

Rimlig dos för barn

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
7,5 mg/kg/dos	0,75 mL	3,8 mL		
10 mg/kg/dos	1 mL	5 mL	10 mL	
15 mg/kg/dos	1,5 mL	7,5 mL	15 mL	75 mL
20 mg/kg/dos			20 mL	100 mL

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-03-31 10:45:08

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-31 10:45:03

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1241

ID/spårnummer: 613

Giltig fr o m: 2015-03-31 10:45:08

Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Paracetamol/Perfalgan IV inf 10 mg/ml

Paracetamol

Dosreduktion med 25% efter 3 dygn.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
				150 mL
Övrig information	Överväg dosreduktion om patienten har en leverpåverkan eller är kraftigt dehydrerad.			

Referens/Länk

FASS , Hämtat: 2014-10-01

<http://www.fass.se/LIF/substance?6&userType=0&substanceid=>

Internetadress Dosering av paracetamol till barn, Hämtat: 2014-10-01

http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/info_fr_LV_2009-6.pdf

Rekommendation ,(Grade 1B), Hämtat: 2014-10-01

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Internetadress Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård - kunskapsdokument, Hämtat: 2015-03-24

<http://eped.se/referenser/>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2015-06-18

<http://eped.se/referenser/>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-03-31 10:45:08

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-31 10:45:03

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1241

ID/spårnummer: 613

Giltig fr o m: 2015-03-31 10:45:08

Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

