

Ibuprofen intravenös inf 5 mg/mL

(Pedeo)

Administreringsätt

Intravenös infusion: Neo: 15 min

Vanlig indikation och dos**Persisterande ductus arteriosus**

10 mg/kg x1 dag 1

5 mg/kg x 1 dag 2 och dag 3

Rimlig dos för barn

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg (2:a+3:e dos)	1 ml	5 ml		
10 mg/kg (1:a dos)	2 ml	10 ml		

Hållbarhet preparat:

Pedeo (registrerad produkt)

 5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar: Sparas inte efter första uttag.

Övrig information

Pedeo innehåller ibuprofen som fri bas samt har trometamol som buffer.

Enligt företaget ska klorhexidin inte användas som desinfektion av ampullen eftersom det ej är kompatibelt.

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2A)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade

Substansspecifika uppgifter

Ibuprofen, C01EB16

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POEKUAAH3VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2016-11-24 23:10:12
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-11-29 10:38:00
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1243
ID/spårnummer: 1737
Giltig fr o m: 2016-11-29 10:38:00
Utskriftsdatum: 2016-11-29

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

