



Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL

(Pedeo)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion/infusion: 15 min

ÖVRIG INFORMATION

Pedeo innehåller ibuprofen som fri bas samt har trometamol som buffer.

Etanol eller isopropylalkohol ska användas för att desinfektera brytampullens hals, för motverka att eventuellt glassplitter som faller ner i ampullen är kontaminerat. Använd filternål vid uppdragning av volym för att ta bort glassplitter. Klorhexidin är enligt företaget inkompatibelt och ska inte användas som desinfektionsmedel.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Pedeo (registrerad produkt)

5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Oanvänd lösning i brytampull ska kasseras och får inte sparas. Uppdragen volym bör användas snarast. Kemisk hållbarhet tillåter 12 tim rumstemperatur och 24 tim kylskåp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Persisterande ductus arteriosus

Nyfödda:

Dag 1: 10 mg/kg x 1

Dag 2 och 3: 5 mg/kg x 1

RIMLIG DOS FÖR 5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg	1 mL	5 mL	-	-
10 mg/kg	2 mL	10 mL	-	-

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1243

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-09-28

ePedID: 1243

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-10-02

Versionsnummer, major: 7

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-10-02

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT