

ILOMEDIN, IV inf  
 iloprost 0,5 mikrog/ml  
 enl spädn-instruktion

**OBS Flera administreringsätt finns. Kontrollera att rätt instruktion används.**

<i>inf konc</i>			<i>IV inf</i>
20 mikrog/ml		NaCl 9 mg/ml	0,5 mikrog/ml
1 ml	+	39 ml	= 40 ml

Beredningsinstruktion: Skaka om blandningen noga. För spädn för inh se avsnitt för läkemedel för inh.

Administrering: Kontin inf. Max 6 tim/dag.

Hållbarhet efter iordningställande: 12 tim i rt

Hållbarhet originalförp: Inga särskilda förvaringsanvisningar. Sparas inte efter första uttag.

Varunummer: 509620, Ilomedin infkonc 20mkg/ml, 5 x 1 ml

Källa: FASS

Obs: Allergent läkemedel, hanteras enligt neo läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation: Pulmonell hypertension

Vanlig dos: Ordineras i samråd med barnkardiolog! 0,1-0,3 mikrog/kg x 4-6 (-12); 0,5-1 (-2)  
 nanog/kg/min

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för iloprost 0,5 mikrog/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
INF 1 ng/kg/min	0,06 ml/tim	0,12 ml/tim	0,24 ml/tim	0,36 ml/tim
0,1 mikrog/kg/dos	0,10 ml	0,20 ml	0,40 ml	0,60 ml
0,3 mikrog/kg/dos	0,30 ml	0,60 ml	1,20 ml	1,80 ml