



Heparin intravenös inf 5 E/mL

(Heparin APL) vid katetervård och koagulationsrubbning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Heparin APL 5 E/mL, bör beställas om möjligheten finns

Alt. 2: Spädning från Heparin APL 100 E/mL

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 2

Heparin APL		NaCl 9 mg/mL		INF
100 E/mL				5 E/mL
0,5 mL	+	9,5 mL	=	10 mL

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion: För genomspolning av intravenös infart

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Heparin APL (extempore - lagervara)

5 E/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur

100 E/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i högst 25 °C. Efter första uttag: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Profylax mot kateterrelaterad trombos

Spolvätska för intravenösa infarter

Koagulationsrubbning

OBS! Ordineras av koagulationsjour.

Laddningsdos: 75 E/kg, varefter c:a 28 E/kg/tim med målsättning
APTT 80 - 120 sek eller antiFXa 0,3 - 0,7 hämmarenheter.

Överväg annan heparinkoncentration om volymerna blir stora.

REFERENS/LÄNK

APL databas (AIDA)

<https://www.apl.se/vard-och-apotek.html>

Rekommendation (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-07-02

ePedID: 1248

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2020-07-02

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-07-02

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT