

Riastap IV inj, IV inf 20 mg/ml

En-stegspädning till 20 mg/mL 50 mL

Riastap		Sterilt Vatten		IV
1 g	+		=	20 mg/mL
1 st		50 mL		50 mL

Beredningsinstruktion

Värm till rumstemp. Rulla flaskan, skaka inte. Pulvret ska lösas inom 15 minuter (vanligtvis 5-10 min).

Farmaceutiska uppgifter

Riastap (Registrerad Produkt)

- 20 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning, Hållbar: 8 tim rumstemp, förvara INTE i kylskåp.
- 1 g, Pulver till injektionsvätska, lösning, Hållbar: Se förpackning, skydda mot ljus

Administreringsätt

Injiceras eller infunderas sakta. Max 5 ml/min

Vanlig indikation och dosering

Indikation: Koagulationsrubbnig

Dos: Ordineras i samråd med koagulationsjour/ barnkoagulationskonsult!

Dos beror av flera faktorer, se FASS.

Övrigt

Tidigare användes Haemocompletan P

Substansspecifika uppgifter

Human fibrinogen, B02BB01

Referens/Länk

BNF-C Riastap

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/PHP18166-fibrinogen-dried.htm?q=fibrinogen&t=search&ss=text&p=1>

FASS via fass.se Riastap

http://www.fass.se/Lif/produktfakta/artikel_produktsjp?NpIID=20100420000018&DocTypeID=3

Rekommendation (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2013-08-22 14:02:30
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2013-08-23 09:31:45
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1252
ID/spårnummer: 52
Giltig fr o m: 2013-08-23 09:31:45
Utskriftsdatum: 2013-08-23

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

