



Fibrinogen intravenös inf/inj 20 mg/mL

(ex Riastap)

Ordineras i samråd med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour

EN-STEGSSPÄDNING

Fibrinogen		Sterilt Vatten		INJ-INF LÖ
1 g				20 mg/mL
1 st	+	50 mL	=	50 mL

Beredningsinstruktion:

Utan att öppna injektionsflaskorna, värm både pulver och spädningsvätska till rums- eller kroppstemperatur. Roter flaskan försiktigt vid upplösning av pulvret. Skaka inte, eftersom det kan leda till skumbildning.

Pulvret löses vanligtvis upp under 5 - 10 min, ska vara upplöst inom 30 minuter.

I Fibrygaförpackningen medföljer ett överföringsset som ska användas.

ARBETSMILJÖ

Ursprung från blodprodukt, hantera enligt lokal rutin, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion/infusion: 2 - 3 min, max 5 mL/min

Ska administreras i egen kateter/kateterlumen.

RIMLIG DOS för Fibrinogen intravenös inf/inj 20 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
30 mg/kg	-	7,5 mL	15 mL	75 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Fibrinogen (registrerad produkt)

20 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 8 tim (Riastap) eller 12 tim (Fibryga) i rumstemperatur, ska INTE förvaras i kylskåp.

1 g, Pulver till injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen i kylskåp (2 - 8 °C). Ljuskänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Koagulationsrubbnig

Barn: Startdos 30 (- 50) mg/kg

Fortsatt behandling styrs utifrån följande ekvation:

Dos (mg/kg) = (Önskad fibrinogenkonc (g/L) - Aktuellt fibrinogen (g/L)) / 0,017

Doser upp till 150 mg/kg kan förekomma, men är inte en nationell behandlingspraxis.

Kontakta koagulationsjour vid frågor.

REFERENS/LÄNK

Artikel Blain S. and Paterson. Paediatric massive transfusion

<https://academic.oup.com/bjaed/article/16/8/269/2364823>

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH), Hemostas vid allvarlig blödning

<http://www.ssth.se/lankar>

Rekommendation ,(Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1252

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-05-03

ePedID: 1252

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-05-08

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-05-08

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT