



## Glukos oralt 300 mg/mL (30 %)

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Injektionsvätska, lösning 300 mg/mL används för ORALT bruk.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Droppas i munnen. Använd tröstnapp eller annan oral stimulering.

Ge halva dosen cirka 1 - 2 min före ingreppet. Ge resterande mängd uppdelat på flera fraktioner för bäst effekt.

Får administreras av vårdnadshavare eller assistent.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Glukos (registrerad produkt)

300 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemp. Efter första uttag för peroralt bruk 24 tim i rumstemp, 7 dagar i kylskåp.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Procedursmärta

Prematura barn: 0,1 - 0,4 mL

Fullgångna barn: 1 - 2 mL

Ge halva dosen cirka 1 - 2 min före ingreppet. Ge resterande mängd uppdelat på flera fraktioner för bäst effekt.

Dosen kan upprepas 1 - 2 gånger.

### ÖVRIG INFORMATION

Vid ev. restsituation av glukos 300 mg/mL kan den medicintekniska produkten, Algopedol-Sucrose 24 %, vara ett alternativ. Denna produkt innehåller sukros som är en sammansatt sockerart bestående av glukos och fruktos.

### REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

<https://lv.se/procedursmarta-barn>

Rekommendation (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Sockerlösning mot smärta vid injektioner och provtagning på spädbarn

[https://www.sbu.se/2012\\_08](https://www.sbu.se/2012_08)

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnsmärtförening - Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden

<http://www.svenskbarnsmartforening.se/svenskbarnsmartforening/extern/nyfoddhetssmarta.htm>

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-12-06

ePedID: 1254

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-12-11

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-12-11

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**

ePedID: 1254.3 Giltig fr o m: 2019-12-11

Versionshantering: [http://eped.sll.sjunet.org/eped/instructions/show\\_instruction\\_1254.html](http://eped.sll.sjunet.org/eped/instructions/show_instruction_1254.html)