

GILUDOP 0,6 mg/ml, IV inf

dopamin 0,6 mg/ml

enl spädn-instruktion

OBS Flera styrkor finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

<i>inf konc</i>			<i>IV inf</i>
20 mg/ml		glukos 50 mg/ml alt glukos 100 mg/ml	0,6 mg/ml
0,9 ml	+	29 ml	= 29,9 ml

Administrering: Administration: Kontin inf i central ven eller stor perifer ven. Obs! får ej ges i artärfart.

Extravasal inf kan orsaka nekros.

Hållbarhet efter iordningställande: Resterande lösning får ej sparas

Hållbarhet originalförp: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Varunummer: 12442, Giludop infkonc 20mg/ml, 5 x 10 ml

Källa: FASS

Indikation: 1) Hypotension 2) Dålig diures pga dålig njurgenomblödning

Vanlig dos: 1) 5-12,5 mikrog/kg/min 2) 1-5 mikrog/kg/min

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för dopamin 0,6 mg/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
INF 1 mikrog/kg/min	0,05 ml/tim	0,10 ml/tim	0,20 ml/tim	0,30 ml/tim
INF 12,5 mikrog/kg/min	0,63 ml/tim	1,25 ml/tim	2,50 ml/tim	3,75 ml/tim