

Aciklovir konjunktivalt 3 % (Zovirax)

Administreringsätt

I nedre konjunktival-säcken

Vanlig indikation och dos

Herpes Simplex keratit

1 cm lång salvsträng x 5, ungefär 4 timmars intervall.

Behandlingstid: 10 - 12 dagar, behandlingen bör fortgå under minst 3 dagar efter att symtomen har avklingat.

Hållbarhet preparat:

Zovirax (Registrerad Produkt)

3 %, Ögonsalva

Hållbar: Bruten förpackning till enskild patient ska användas inom 1 mån, bruten förpackning till flera patienter ska användas inom 1 vecka.

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2016-09-27

<https://www.medicinescomplete.com/mc/bnflegacy/current/>

FASS , Hämtat: 2016-09-27

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkemedelsverket, Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicella- och herpes zosterinfektioner, Hämtat: 2016-09-28

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/herpes1_rek_bokm%C3%A4rken.pdf

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2016-10-04

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Aciclovir, S01AD03

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POF7UAS78VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2016-09-27 16:45:04

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-10-04 15:39:49

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1259

ID/spårnummer: 1574

Giltig fr o m: 2016-10-04 15:39:49

Utskriftsdatum: 2016-10-04

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

