



Aciklovir konjunktivalt 3 %

(Zovirax) ögonsalva

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Ögonsalva Zovirax 3 %

ADMINISTRERINGSSÄTT

I nedre konjunktival-säcken

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Zovirax (registrerad produkt)

3 %, Ögonsalva

HÅLLBAR: Bruten förpackning till enskild patient ska användas inom 1 mån,
bruten förpackning till flera patienter ska användas inom 1 vecka.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Herpes Simplex keratit

1 cm lång salvsträng x 5, ca var 4:e timme under den vakna delen av dygnet.

Behandlingstid: 10 - 12 dagar, behandlingen bör fortgå under minst 3 dagar efter att symtomen har avklingat.

Patienten bör remitteras till ögonläkare för uppföljning.

ÖVRIG INFORMATION

Övergående milda stickningar kan förekomma direkt efter applicering.

Kontaktlinser ska inte användas under behandlingstiden.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAV - Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicella- och herpes zosterinfektioner

<https://www.sls.se/rav/rekommendationer/herpes-simplex-och-varicella-zoster-virus/>

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-10-17

ePedID: 1259

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-10-17

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-10-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT