



Aciklovir konjunktivalt 30 mg/g = 3 %

(ex Xorox) ögonsalva

ADMINISTRERING

I nedre konjunktival-säcken

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Aciklovir (registrerad produkt)

30 mg/g, Ögonsalva

Förvaras under 25 °C. Bruten förpackning till enskild patient ska användas inom 1 mån, bruten förpackning till flera patienter ska användas inom 1 vecka.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Herpes simplex keratit

1 cm lång salvsträng x 5, ca var 4:e timme under den vakna delen av dygnet.

Behandlingstid: 10 - 12 dagar, behandlingen bör fortgå under minst 3 dagar efter att symtomen har avklingat.

Patienten bör remitteras till ögonläkare för uppföljning.

ÖVRIG INFORMATION

Övergående milda stickningar kan förekomma direkt efter applicering.

Kontaktlinser ska inte användas under behandlingstiden.

REFERENSLÄNK

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAV, Referensgruppen för antiviral terapi - Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicella- och herpes zosterinfektioner

<https://www.sls.se/rav/rekommendationer/herpes-simplex-och-varicella-zoster-virus/>

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén

ePedID: 1259

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-05-11

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT