

Furosemid intravenös inj 10 mg/mL (ex Furix)

Flera styrkor kan finnas. Denna instruktion gäller injektionsbehandling.

Överväg kaliumsparande diuretika alternativ kaliumsubstitution som tilläggsbehandling.

Vid behov av infusion kan furosemid spädas, se annan instruktion.

Administreringsätt

Intravenös injektion: Får ej överstiga 0,5 mg/kg/min pga risk för ototoxicitet.

Exempelvis:

1 mg/kg ges på minst 2 min

5 mg/kg ges på minst 10 min

Ordinerad dos kan sättas till önskad mängd NaCl 9 mg/ml för att få en hanterbar volym.

Vanlig indikation och dos

Profylax vid volymbelastning av ex. blodprodukt.

Barn 0 - 1 mån: 1 mg/kg

Profylax mot ödem vid bronkopulmonell dysplasi (BPD)

Barn 0 - 1 mån: 1 (- 2) mg/kg x 1 - 2

Profylax mot hjärtsvikt, njursvikt

Barn 0 - 1 mån: 1 - 2 mg/kg x 1 - 2 (ev 5 mg/kg som engångsdos)

Urindrivande

Barn: 0,5 - 1 mg/kg

Vid hypertoni och tecken på övervätskning kan doser om 1 - 5 mg/kg ges.

Urindrivande vid hypertoni hos njurtransplanterade patienter

Barn: 0,5 - 2 mg/kg, 2 - 4 gånger per dygn. Max 6 mg/kg/dygn

Högre doser kan krävas vid sämre GFR och /eller uttalad proteinuri.

Besvärande ödem utan hypovolemi vid nefrotiskt syndrom

0,5 - 2 mg/kg

Rimlig dos för barn

1 kg

5 kg

10 kg

50 kg

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-05-15 15:30:40

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-05-17 11:23:02

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1262

ID/spårnummer: 3236

Giltig fr o m: 2017-05-17 11:23:02

Utskriftsdatum: 2017-05-18

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Furosemid intravenös inj 10 mg/mL (ex Furix)

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	5 mL
3 mg/kg		1,5 mL	3 mL	15 mL
5 mg/kg		2,5 mL	5 mL	25 mL

Hållbarhet preparat:

Furosemid (ex Furix) (registrerad produkt)
 10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning
Hållbar: Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen.
Ljuskänsligt. Resterande lösning får ej sparas

Övrig information

Furosemid får ej blandas med sura lösningar, t ex glukos.

Samtidig användning med aminoglykosider kan ge en additiv oto- och/eller nefrotoxicitet.

Furosemid hämmar den tubulära sekretionen av metotrexat.

Referens/Länk

FASS Furosemid
<http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplid=19801003000053>
Pediatric Injectable Drugs Furosemide
Rekommendation ,(Grade 1B)
http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst
http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1262

Substansspecifika uppgifter

Furosemide, C03CA01
<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POBTU90VUVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-05-15 15:30:40
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-05-17 11:23:02
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1262
ID/spårnummer: 3236
Giltig fr o m: 2017-05-17 11:23:02
Utskriftsdatum: 2017-05-18

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

