

FEIBA, IV inf
 aktiverat protrombinkomplex mot faktor VIII-antikroppar 50
 E/ml
 enl spädn-instruktion

<i>inj/inf subs</i>		<i>IV inf</i>
1000 E	medföljande vätska	50 E/ml
pulver	+ 20 ml	= 20 ml

Beredningsinstruktion: Följ instruktion på bipacksedel

Administrering: Max 2 E/kg/min

Hållbarhet efter iordningställande: Resterande lösning får ej sparas (hållbart ca 3 tim).
 Hållbarhet originalförp: Förvaras i kyl. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Källa: FASS

Obs: Ursprung i blodprodukt, hanteras enligt neo läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation: Koagulationsrubbnig

Vanlig dos: Ordineras av koagulationsjour! Max 100 E/kg/dos, max 200 E/kg/dygn

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för aktiverat protrombinkomplex mot faktor VIII-antikroppar 50 E/r			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
100 E/kg/dos (max)	1,00 ml	2,00 ml	4,00 ml	6,00 ml