

Erytromycin oralt 50 mg/mL (Ery-Max) från dospåse

I denna instruktion finns endast doser för nyfödda. För dosering till större barn hänvisas till andra instruktioner.

En-stegsspädning:	Erytromycin (ex Ery-Max)		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
	200 mg	+		=	50 mg/mL
	1 st		3 mL		4 mL

Beredningsinstruktion: Denna spädninginstruktion skiljer sig från den i dospåsarnas bipacksedel och används när delmängd av dospåsen ska ges. Detta för att veta koncentrationen. Pulvrets volym motsvarar 1 mL.

Ska färdigblandad oral suspension med erytromycin från apoteket användas krävs ny ordination. Den styrkan är på 100 mg/mL. Se annan instruktion.

Arbetsmiljö

Allergisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Erytromycinlaktobionat kan vid intag, hudkontakt eller inandning av damm i sällsynta fall orsaka allergiska reaktioner

Administreringsätt

Oralt:

Dosen bör intas i samband med måltid för att få en bra absorption. Gastrointestinala besvär såsom magknip och illamående kan även minska om dosen tas vid måltid.

Enteralt i sond:

Tar tid innan homogen suspension bildas. Den är lättflytande, men grovkornig med många luftbubblor. Flödar trögt i sond, men spolats lätt bort efter spolning med vatten.

Vanlig indikation och dos

Dygnsdosen kan fördelas på 2 doseringstillfällen men vid gastrointestinala problem/buksmärta kan det vara en fördel att dygnsdosen fördelas på 3 - 4 doseringstillfällen.

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-05-19 11:29:36
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-05-24 11:34:59
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1269
ID/spårnummer: 3246
Giltig fr o m: 2017-05-24 11:34:59
Utskriftsdatum: 2017-05-24

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Erytromycin oralt 50 mg/mL

(Ery-Max) från dospåse

Behandling av infektioner, t.ex. med *Ureaplasma urealyticum* eller *Chlamydia trachomatis*

Nyfödda: 10 - 12,5 (-15) mg/kg x 3 - 4

Behandlingstid: vanligen 14 dagar

Profylax och behandling av kikhosta

Nyfödda: 10 - 12,5 mg/kg x 4

Behandlingstid: 7 - 10 dagar

Stimulering av tarmmotorik

Nyfödda: 1 - 3 mg/kg x 2 - 4

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
3 mg/kg		0,3 mL		
10 mg/kg	0,2 mL	1 mL		
12,5 mg/kg	0,25 mL	1,25 mL		

Hållbarhet preparat:

Erytromycin (ex Ery-Max) (registrerad produkt)

50 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: Får ej sparas, används direkt

Övrig information

Absorptionen av erytromycin i oral suspension är lägre än för erytromycin i kapslar, därför måste en högre dos ges med oral suspension för att motsvarande plasmakoncentration ska uppnås.

Innehåller sackaros.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/.htm>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress INFPREG

<http://www.medscinet.se/infpreg/>

Internetadress Läke medelsverket, Läke medelsboken

<https://lakemedelsboken.se/>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-05-19 11:29:36

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-05-24 11:34:59

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1269

ID/spårnummer: 3246

Giltig fr o m: 2017-05-24 11:34:59

Utskriftsdatum: 2017-05-24

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Erytromycin oralt 50 mg/mL **(Ery-Max) från dospåse**

NeoFax

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Erythromycin, J01FA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POC3U98EIVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-05-19 11:29:36
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-05-24 11:34:59
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1269
ID/spårnummer: 3246
Giltig fr o m: 2017-05-24 11:34:59
Utskriftsdatum: 2017-05-24

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

