



Lidokain + Prilokain utvärtes

(ex EMLA) kräm, plåster

Ska ej användas på öppna sårskador hos barn.

Längre applikationstid än rekommenderad maxtid har orsakat methemoglobinemi hos spädbarn.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Plåster med lidokain + prilokain 25 mg + 25 mg (ex EMLA, Tapin)
Kräm med lidokain + prilokain 25 mg/g + 25 mg/g (ex EMLA, Tapin)

ADMINISTRERING

Utvärtes: För maximal administreringstid, se Vanlig indikation och dos.

Krämen ska appliceras i ett tjockt lager på huden (1 gram per 10 cm²) och täckas med ett ocklusivförband.

Effekten inträder efter ca 1 timme.

Torka bort kräm eller ta bort plåster ca 10 - 15 min innan procedur för att få nytta av den kärldilaterande effekten som kommer efter ca 15 min (lidokain/prilokain ger upphov till en viss kärlkonstriktion primärt).

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

lidokain + prilokain (registrerad produkt)

25 mg/g, Kräm

Får ej frysas. Vid höga hygienkrav bör tuben användas max 7 dagar till flera patienter och max 28 dagar till enskild patient. Vid ej höga hygienkrav, se resp. tillverkare.

25 mg, Medicinskt plåster

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

1 gram kräm motsvarar ca 3,5 cm kräm ur en 30 gram-tub eller 1 mL.

Nyfödda: (KRÄM) Förebyggande av nociceptiv smärta

Gestationsålder över vecka 30:

0,5 gram högst 1 gång per dygn i högst 1 tim.

Gestationsålder över vecka 37:

1 gram högst 1 gång per dygn i högst 1 tim.

Barn: (KRÄM och PLÅSTER) Ytanesesi av huden i samband med nålstick samt vid ytliga kirurgiska ingrepp. Vid skrapning av mollusker.

Maximal dygnsdos:

Barn 1 - 2 mån: 1 gram eller 1 plåster, max 1 tim applikationstid.

Barn 3 - 12 månader: 2 gram eller 2 plåster, max 1 tim applikationstid.

Barn 1 - 5 år: 10 gram eller 10 plåster, minst 1 tim applikationstid, max 5 tim.

Barn 6 - 11 år: 20 gram eller 20 plåster, minst 1 tim applikationstid, max 5 tim.

Barn 12 - 18 år: 60 gram, minst 1 tim applikationstid, max 5 tim.

Barn med atopisk dermatit: reducerad applikationstid till 30 min.

ÖVRIG INFORMATION

Prilokain kan ge upphov till bildning av methemoglobin (Met-Hb). Barn yngre än 3 månader har lägre nivåer av methemoglobinreduktas som konverterar Met-Hb till vanligt hemoglobin. Kombinationsbehandling med t ex följande substanser ökar risken för methemoglobinemi: sulfa, nitrofurantoin och fenobarbital.

Ska inte användas på öppna sårskador hos barn då en ökad absorption ger en ökad risk för methemoglobinemi. Använd istället kompresser med buffrad lidokain.

Använda plåster ska kasseras som läkemedelsavfall ihopvikta med häftmassan inåt.





Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster

REFERENS/LÄNK

Artikel Huq I, Lindh J. EMLA bör inte användas vid öppna sårskador hos barn. Läkartidningen 2021.

<https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/lakemedelsfragan/2021/10/emla-bor-inte-anvandas-vid-oppna-sarskador-hos-barn/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

www.lakemedelsverket.se/smartsam-procedur

PubMed PMID Bond et al. First do no harm: pain relief for the peripheral venous cannulation of adults, a systematic review and network meta-analysis

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27716082>

PubMed PMID Kjellgard C et al. Överdosis av prilokain/lidokain kan ge svår methemoglobinemi - Tre fall där krämen gett toxiska effekter hos spädbarn [Intoxication with prilocaine/lidocaine can cause serious methemoglobinemia]. Läkartidningen. 2019

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31573668>

Rekommendation , (Grade 1D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 1273

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-02-01

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT