

Kloxacillin (ex Ekvacillin, Cloxacillin) IV inf 20 mg/mL

Cloxacillin

**OBS. Flera styrkor finns.
Stor risk för förväxling, kontrollera styrkan noggrant.**

En-stegsspädning:	Kloxacillin		NaCl 9 mg/mL		INF
Alternativ 1	1 g	+		=	20 mg/mL
	1 st		50 mL		50 mL

En-stegsspädning:	Kloxacillin		NaCl 9 mg/mL		INF
Alternativ 2	2 g	+		=	20 mg/mL
	1 st		100 mL		100 mL

Hållbarhet preparat:

Kloxacillin (Registrerad Produkt)

- 20 mg/mL, Infusionsvätska, lösning, Hållbar: 6 timmar i rumstemperatur i rumsbelysning och 24 timmar i kylskåp i skydd för ljus

Arbetsmiljö

Allergisk, hanteras enl läkemedelsinstruktioner., Penicilliner kan ge allergi vid inandning, hudkontakt och förtäring. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner

Administreringssätt

Intravenös infusion: Barn: Ges som intravenös infusion under 20 - 30 minuter. Kan ges både i central och perifer infart.

Vanlig indikation och dos

Neo: Systemisk bakteriell infektion, osteomyelit.	Dosera utifrån postnatal ålder 0 - 1 vecka: 50 mg/kg x 2 1 - 3 veckor: 50 mg/kg x 3 3 - 4 veckor: 50 mg/kg x 4
	Vid meningit och osteomyelit kan 100 mg/kg/dos övervägas.
Barn: Systemisk bakteriell infektion, osteomyelit.	Barn under 20 kg: (25) - 50 mg/kg x 3 - 4 Barn över 20 kg: 50 mg/kg x 3 - 4, max 6 g per dygn

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2014-04-23 15:22:14

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2014-11-21 17:04:07

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1274

ID/spårnummer: 446

Giltig fr o m: 2014-11-21 17:04:12

Utskriftsdatum: 2014-11-21

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Kloxacillin (ex Ekvacillin, Cloxacillin) IV inf 20 mg/mL

Cloxacillin

**OBS. Flera styrkor finns.
Stor risk för förväxling, kontrollera styrkan noggrant.**

Barn: Profylax inför operation.	50 mg/kg som engångsdos. Om operationen fortfarande pågår efter 4 timmar upprepas dosen. Maximal engångsdos 2 g.
Barn: Antibiotikabehandling vid öppna frakturer.	Öppna frakturer (profylax och behandling): Grad I och II: 33 mg/kg x 3 under 1 dygn. Grad III: 33 mg/kg x 3 under 3 dygn. Maxdos 6 g per dygn.
Luftvägsinfektion vid CF	50 mg/kg x 4, max 4,5 gram/dygn.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
33 mg/kg	1,65 mL	8,2 mL	16,5 mL	82,5 mL
50 mg/kg	2,5 mL	12,5 mL	25 mL	125 mL

Referens/Länk

FASS , Hämtat: 2014-11-18

<http://www.fass.se/LIF/substance?6&userType=0&substancelid=>

Internetadress Kloxacillin till nyfödda, Hämtat: 2014-11-18

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2528592/>

Neonatal Formulary , Hämtat: 2014-11-18

Rekommendation ,(Grade 2A), Hämtat: 2014-04-08

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_toe.cfm?show-grade

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Antibiotikabehandling vid ortopedisk kirurgi och öppna frakturer på barn, Hämtat: 2014-04-08

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/ID0D9F96F76CB4FE4DC125798A00370C60?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Bentransplantation - PM, Hämtat: 2014-04-08

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/ID494CCA0C6457D1E1C1257A2300391CE5?OpenDocument>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2014-04-23 15:22:14

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2014-11-21 17:04:07

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1274

ID/spårnummer: 446

Giltig fr o m: 2014-11-21 17:04:12

Utskriftsdatum: 2014-11-21

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

