

Laktulos 670 mg/ml oral lösning

Lactulose

Hållbarhet preparat:

Laktulos Meda (Registrerad Produkt)

- 670 mg/mL, Oral lösning, Hållbar: Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

Administreringsätt

Enteralt

Enteralt i sond: Går att ges i sond men mycket trögflytande. Kan lösas upp i lite vatten (späd 2-3 ggr för att minska viskositeten). Bör ges i mindre sprutor för att få högre tryck.

Vanlig indikation och dos

Regelbunden medicinering mot förstoppning	Neo: 0,5 -3 ml x 1-2 Barn yngre än 1 år: 5 ml på morgonen (max 20 ml/dygn) Barn äldre än 1 år: 10 ml (max 50 ml/dygn)
---	---

Övrig information

Dosen är individuell och bör justeras så att avföring blir halvfast.

Referens/Länk

FASS , Hämtat: 2013-11-15

<http://www.fass.se/LIF/substance?userType=0&substanceId=>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes , Hämtat: 2014-10-16

Rekommendation ,(Grade 1B), Hämtat: 2014-10-24

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Vårdprogram för förstoppning hos barn och ungdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Hämtat: 2014-10-16

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/8831d344796a5abdc1256bce0042d1a4/29af239eb608a2aec1257aa50066c51c?OpenDocument>

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2014-10-24 10:09:56

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2014-10-24 10:05:41

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1275

ID/spårnummer: 390

Giltig fr o m: 2014-10-24 10:09:56

Utskriftsdatum: 2014-10-24

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

