

Bromhexin oralt 0,8 mg/mL (ex Bisolvon)

Bromhexine

Administreringsätt

Oralt

Vanlig indikation och dos

Segt luftvägssekret

Neo: 0,2 mg/kg x 3

Slemlösande

Barn 1 - 5 år: 2,5 mL x 3

Barn 6 - 12 år: 2,5 - 5 mL x 3

Barn över 12 år: 10 mL x 3

Rimlig dos för barn

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,2 mg/kg	0,25 mL	1,2 mL		

Övrig information

Försiktighet med Bisolvon vid ulcus och vid större hemoptys.

Bisolvon innehåller etanol (96 %) alkoholhalt motsvarande 3,6 % (v/v).

Smak: körsbär och choklad.

Bromhexin omvandlas till ambroxol i kroppen. Den europeiska läkemedelsmyndigheten har påbörjat en granskning av läkemedel som innehåller ambroxol och bromhexin med anledning av ökat antal rapporter om allergiska reaktioner.

Referens/Länk

FASS Bisolvon oral lösning, Hämtat: 2015-10-22

<http://www.fass.se/LIF/product?13&userType=2&nplid=1975082900030&docType=6>

Rekommendation (Grade 2C), Hämtat: 2015-10-23

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Internetadress Granskning av ambroxol och bromhexin inleds, Hämtat: 2015-10-22

<https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2014/Granskning-av-ambroxol-och-bromhexin-inleds/>

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-10-22 10:01:37

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-10-23 11:36:22

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1289

ID/spårnummer: 907

Giltig fr o m: 2015-10-23 11:36:22

Utskriftsdatum: 2015-10-23

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

