



Betametason oralt 0,1 mg/mL

(ex Betapred) lösning från tablett

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Upplösning av tablett 0,5 mg i sterilt vatten till oral lösning 0,1 mg/mL.

För användning av betametason vid andra indikationer, se instruktioner för andra styrkor och beredningsformer.

EN-STEGSSPÄDNING

Betametason		Sterilt Vatten		ORAL LÖSN
0,5 mg	+		=	0,1 mg/mL
1 st		5 mL		5 mL

Beredningsinstruktion:

Lägg en tablett betametason 0,5 mg i en 10 mL oral spruta. Dra upp sterilt vatten till totalt 5 mL. Se till att tablett löser sig fullständigt.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

ÖVRIG INFORMATION

Internationellt används ofta dexametason på denna indikation. 0,6 mg betametason motsvarar 0,75 mg dexametason.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Betametason (registrerad produkt)

0,1 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Resterande lösning får ej sparas.

0,5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Fuktkänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Weaning/urträning från respirator eller risk för svår BPD-utveckling

Nyfödda:

Doseringsalternativen nedan grundar sig på olika behandlingstraditioner. Viss evidens finns, se referenser.

Alternativ 1

Behandlingsdag 1: 0,1 mg/kg x 2

Behandlingsdag 2: 0,05 - 0,1 mg/kg x 2

Behandlingsdag 3: 0,05 mg/kg x 2

Från behandlingsdag 4: 0,05 mg/kg x 1 utifrån kliniskt svar

Alternativ 2

Behandlingsdag 1 - 2: 0,15 mg/kg x 2

Behandlingsdag 3 - 4: 0,075 mg/kg x 2

Behandlingsdag 5 - 7: 0,025 mg/kg x 2

RIMLIG DOS FÖR 0,1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,025 mg/kg	0,25 mL	1,25 mL	-	-
0,05 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	-	-
0,1 mg/kg	1 mL	5 mL	-	-
0,15 mg/kg	1,5 mL	7,5 mL	-	-



Betametason oralt 0,1 mg/mL (ex Betapred) lösning från tablett

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Doyle LW et al. Early (< 8 days) systemic postnatal corticosteroids for prevention of bronchopulmonary dysplasia in preterm infants.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29063585>

PubMed PMID Doyle LW et al. Late (> 7 days) systemic postnatal corticosteroids for prevention of bronchopulmonary dysplasia in preterm infants.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29063594>

PubMed PMID Smolkin T et al. Experience with oral betamethasone in extremely low birthweight infants with bronchopulmonary dysplasia.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25074982>

Rekommendation (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1293

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-04-10

ePedID: 1293

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-10

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-04-10

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT