



Hydroxokobalamin intramuskulär inj 1 mg/mL

(Vitamin B12, fd Behepan)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intramuskulär injektion

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Hydroxokobalamin (registrerad produkt)

1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i ytterkartongen, ljuskänsligt. Sparas ej efter första uttag.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Metabol defekt i kobalamin-transport eller -metabolism, metylmalonsyreuri och homocystinuri

Ordineras av specialist i metabola sjukdomar.

Barn (oavsett ålder och vikt): 1 mg x 1

Vitamin B12-brist

Barn (oavsett ålder och vikt): 1 mg, engångsdos

Kan upprepas var 2 - 3 mån.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Bok Zschocke J, Hoffmann GF. Vademecum metabolicum, diagnosis and treatment of inborn errors of metabolism. Tredje utgåvan 2011.

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1297

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-11-25

ePedID: 1297

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-01-19

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-01-19

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT