

Ipratropiumbromid inhalation för nebulisation (ex Atrovent)

AERONEB:

Ordinerad dos Atrovent blandas med NaCl 9 mg/mL till en total volym om 2 mL.

AIOLOS:

Ordinerad dos Atrovent blandas med NaCl 9 mg/mL till en total volym om minst 2 mL. Maxvolym 8 mL.

Kan vid behov kombineras och ges tillsammans med Ventoline.

MAXIN:

Atrovent 5 mg/mL ges utspädd i MAXIN, 2 mL.

Vid kombination med Ventoline blandas 1 mL Atrovent 0,25 mg/mL med 1 mL Ventoline 5 mg/mL.

Administreringsätt**AERONEB:**

Inhalera tills behållaren är "tom". Restvolym ca 0,1 mL.

AIOLOS

Inhalera tills behållaren är "tom". Restvolym ca 0,5 mL.

MAXIN

Inhalera i första hand via munstycke eller mask som sluter tätt mot ansiktet. I andra hand flöda med mask eller slang 1 cm från näsa och mun.

Vanlig indikation och dos**Neo: Obstruktiv lungsjukdom**

25 mikrog/kg x 3

Alternativt: 0,5 mL x 2



Ipratropiumbromid inhalation för nebulisation (ex Atrovent)

Akut astma/obstruktivitet.

Kan ges i kombination med Ventoline, alternativt utan för barn med oacceptabla biverkningar av Ventoline.

AIOLOS

För alla barn oavsett vikt:
0,25 mg (dvs 1 ml Atrovent 0,25 mg/ml + 1 ml NaCl 9 mg/ml).

Kan vid behov kombineras och ges tillsammans med Ventoline.
Obs! Ordinerar som två separata ordinationer.

Dosen kan upprepas efter 15 min.

MAXIN

För alla barn oavsett vikt:
0,25 mg (dvs 1 ml Atrovent 0,25 mg/ml + 1 ml NaCl 9 mg/ml).

Kan vid behov kombineras och ges tillsammans med Ventoline. I så fall blandas 1 ml Atrovent 0,25 mg/ml med 1 ml Ventoline 5 mg/ml.
Obs! Ordinerar som två separata ordinationer.

Barn under 30 kg som inhalerar med munstycke eller tätslutande mask ska inhalera 1 minut.

Barn över 30 kg som inhalerar med munstycke eller tätslutande mask ska inhalera 2 minuter.

För barn som flödar med mask eller slang fördubblas inhalationstiden.

Dosen kan upprepas efter 15 min.

Tilläggsbehandling till salbutamol när barnet är mer hyperreaktivt än obstruktivt.

Barn under 12 år: 1 mL Atrovent 0,25 mg/mL x 4

Barn över 12 år: 2 mL Atrovent 0,25 mg/mL x 4

Hållbarhet preparat:

Atrovent (Registrerad Produkt)

0,25 mg/mL, Lösning för nebulisator

Hållbar: Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänslig. Sparas ej efter första uttag.

Referens/Länk

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-02-24 14:26:09

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-02-24 14:26:15

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1298

ID/spårnummer: 1105

Giltig fr o m: 2016-02-24 14:26:15

Utskriftsdatum: 2016-02-25

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Ipratropiumbromid inhalation för nebulisation (ex Atrovent)

Internetadress Barnallergisektionen Stencil Akut astma behandling, Hämtat: 2016-02-09

http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/d9_akut%20astma.pdf

Internetadress Inhalationstid och dosering med Maxin. Info från företaget, Hämtat: 2016-02-04

<http://www.clinova.se/bilder/00.Dosering%202016.pdf>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Gemensamt PM för Stockholms barnsjukhus: Akut astma, Hämtat: 2012-10-22

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID3D49C4F6FB883AEC1257A29003F583C>

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2016-02-12

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Ipratropium bromide, R03BB01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POHXUCOPTVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-02-24 14:26:09
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-02-24 14:26:15
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1298
ID/spårnummer: 1105
Giltig fr o m: 2016-02-24 14:26:15
Utskriftsdatum: 2016-02-25

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

