

Ipratropiumbromid inhalation för nebulisation (ex Atrovent)

Denna instruktion innehåller information om administrering i olika inhalationshjälpmedel.

Instruktionen gäller för: Lösning för nebulisator i endosbehållare:
Atrovent 0,25 mg/mL
Ipraxa 500 mikrog/2 mL

Administreringssätt

AERONEB

Ordinerad dos ipratropiumbromid blandas med NaCl 9 mg/mL till en total volym om minst 2 mL. Maxvolymen varierar, ex 6 mL i Aeroneb Go och 10 mL i Aeroneb Pro.

Inhalera tills behållaren är "tom". Restvolym ca 0,1 mL.

AIOLOS/PARI BOY

Ordinerad dos ipratropiumbromid blandas med NaCl 9 mg/mL till en total volym om minst 2 mL. Maxvolym 8 mL.

Inhalera tills behållaren är "tom". Restvolym ca 0,5 mL.

MAXIN

Ipratropiumbromid ges utspädd i MAXIN, minst 2 mL. Maxvolym 5 mL.

Inhalera i första hand via munstycke eller mask som sluter tätt mot ansiktet. I andra hand flöda med mask eller slang 1 cm från näsa och mun.

Maxin nebuliserar 0,25 - 0,30 mL/min. Inhalationstiden styr vilken mängd läkemedel patienten får i sig.

Vanlig indikation och dos

Obstruktivitet/obstruktiv lungsjukdom

AERONEB

Nyfödda: 0,025 mg/kg x 3 alternativt 0,5 mL x 2

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-02-12 14:39:30

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-21 15:35:11

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 1298

ID/spårnummer: 4389

Giltig fr o m: 2018-02-21 15:35:11

Utskriftsdatum: 2018-02-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Ipratropiumbromid inhalation för nebulisation (ex Atrovent)

Akut astma/obstruktivitet (Ges normalt i kombination med salbutamol.)

Akut behandling: Dosen kan upprepas efter ca 15 - 20 min första timmen.
Underhållsbehandling: 4 gånger per dygn

AERONEB/AIOLOS/PARI BOY

Barn 1 mån - 12 år: 0,25 mg

Barn över 12 år: 0,5 mg

MAXIN Obs! Ordineras i tid (minuter)

Barn som inhalerar med munstycke eller tätslutande mask:

Barn under 30 kg: 1 minut

Barn över 30 kg: 2 minuter

För barn som flödar med mask eller slang fördubblas inhalationstiden.

Dosen upprepas vanligen efter 15 min.

AIOLOS/MAXIN

Kan vid behov kombineras och administreras tillsammans med salbutamol. I så fall blandas ipratropiumbromid 0,25 mg/mL med 1 mL salbutamol 5 mg/mL. För doser av ipratropiumbromid se ovan under respektive inhalationshjälpmedel. Dubblerad inhalationstid i MAXIN vid kombinationsbehandling.

Hållbarhet preparat:

Atrovent (registrerad produkt)

● 0,25 mg/mL, Lösning för nebulisator

Hållbar: Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänslig. Sparas ej efter första uttag.

Referens/Länk

Internetadress Aeroneb Go - Portabel nebulisator

<http://www.dolema.com/produkters/hemvard-andning/aeroneb-go-portabel-nebulisator/>

Internetadress Barnallergisektionen Stencil Akut astma behandling

http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/d9_akut%20astma.pdf

Internetadress Inhalationstid och dosering med Maxin. Info från företaget

<https://www.aimedical.se/maxin.htm>

Internetadress Läkemedelsverket, behandlingsrekommendation Astma

<https://lv.se/astma>

Internetadress Maxin bruksanvisning från företaget

https://www.aimedical.se/Snabbinstruktion_Maxin.pdf

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-02-12 14:39:30

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-21 15:35:11

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 1298

ID/spårnummer: 4389

Giltig fr o m: 2018-02-21 15:35:11

Utskriftsdatum: 2018-02-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Ipratropiumbromid inhalation för nebulisation (ex Atrovent)

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1298

Substansspecifika uppgifter

Ipratropium bromide, R03BB01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POHXUCOPTVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-02-12 14:39:30
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-21 15:35:11
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1298
ID/spårnummer: 4389
Giltig fr o m: 2018-02-21 15:35:11
Utskriftsdatum: 2018-02-22

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

