



Ipratropiumbromid inhalation för nebulisation

(ex Atrovent)

Denna instruktion innehåller information om administrering i olika inhalationshjälpmedel.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Lösning för nebulisator i endosbehållare:
Atrovent 0,25 mg/mL
Ipraxa 500 mikrog/2 mL

ADMINISTRERINGSSÄTT

AERONEB
Ordinerad dos ipratropiumbromid blandas med NaCl 9 mg/mL till en total volym om minst 2 mL. Maxvolymen varierar, ex 6 mL i Aeroneb Go och 10 mL i Aeroneb Pro.
Inhalera tills behållaren är "tom". Restvolym ca 0,1 mL.

AIOLOS/PARI BOY
Ordinerad dos ipratropiumbromid blandas med NaCl 9 mg/mL till en total volym om minst 2 mL. Maxvolym 8 mL.
Inhalera tills behållaren är "tom". Restvolym ca 0,5 mL.

MAXIN
Ipratropiumbromid ges utspädd i MAXIN, minst 2 mL. Maxvolym 5 mL.
Inhalera i första hand via munstycke eller mask som sluter tätt mot ansiktet. I andra hand flöda med mask eller slang 1 cm från näsa och mun.
Maxin nebuliserar 0,25 - 0,30 mL/min. Inhalationstiden styr vilken mängd läkemedel patienten får i sig.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Atrovent (registrerad produkt)

0,25 mg/mL, Lösning för nebulisator

HÅLLBAR: Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänslig. Sparas ej efter första uttag.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Obstruktivitet/obstruktiv lungsjukdom

AERONEB
Nyfödda: 0,025 mg/kg x 3 alternativt 0,5 mL x 2

Akut astma/obstruktivitet (Ges normalt i kombination med salbutamol.)

Akut behandling: Dosen kan upprepas efter ca 15 - 20 min första timmen.
Underhållsbehandling: 4 gånger per dygn

AERONEB/AIOLOS/PARI BOY
Barn 1 mån - 12 år: 0,25 mg
Barn över 12 år: 0,5 mg

MAXIN Obs! Ordineras i tid (minuter)
Barn som inhalerar med munstycke eller tätslutande mask:
Barn under 30 kg: 1 minut
Barn över 30 kg: 2 minuter
För barn som flödar med mask eller slang fördubblas inhalationstiden.

Dosen upprepas vanligen efter 15 min.

AIOLOS/MAXIN
Kan vid behov kombineras och administreras tillsammans med salbutamol. I så fall blandas ipratropiumbromid 0,25 mg/mL med 1 mL salbutamol 5 mg/mL. För doser av ipratropiumbromid se ovan under respektive inhalationshjälpmedel.
Dubblerad inhalationstid i MAXIN vid kombinationsbehandling.



Ipratropiumbromid inhalation för nebulisation (ex Atrovent)

REFERENS/LÄNK

Internetadress Aeroneb Go - Portabel nebulisator

<http://www.dolema.com/produkters/hemvard-andning/aeroneb-go-portabel-nebulisator/>

Internetadress Barnallergisektionen Stencil Akut astma behandling

http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/d9_akut%20astma.pdf

Internetadress Inhalationstid och dosering med Maxin. Info från företaget

<https://www.ajmedical.se/maxin.htm>

Internetadress Läke medelsverket, behandlingsrekommendation Astma

<https://lv.se/astma>

Internetadress Maxin bruksanvisning från företaget

https://www.ajmedical.se/Snabbinstruktion_Maxin.pdf

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1298

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-04-16

ePedID: 1298

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-17

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-04-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT