

Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Atenativ)

Atenativ är inte utbytbar med Antithrombin III Baxalta.

En-stegsspädning:	Atenativ		Medföljande vätska		INF
	500 E	+		=	50 E/mL
	1 st		10 mL		10 mL

Beredningsinstruktion: Använd inte lösningen om den är grumlig eller innehåller fällning.

Arbetsmiljö Ursprung i blodprodukt, -

Administreringsätt

Intravenös infusion: Ges under 10 - 20 minuter. Max 100 E/min (2 mL/min).

Administreras i separat kateter/kateterlumen. Kan inte ges via in-linefilter/infusionsfilter.

Vid administrering ska produktnamn samt batchnummer eller motsvarande dokumenteras i journalen.

Vanlig indikation och dos

Ordineras i samråd med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour

Koagulationsrubbning

Initial dos bestäms med hjälp av någon av följande ekvationer:

Alt a) Erforderliga enheter = kroppsvikt (kg) x (önskad nivå [%] - uppmätt antitrombinaktivitet [%]) x 1

Alt b) Erforderliga enheter = kroppsvikt (kg) x (önskad nivå - uppmätt antitrombinaktivitet [E/mL]) x 100

Efter initial dos anpassas dos, administreringsintervall samt behandlingens längd efter kliniska data och uppföljande provsvar.

Hållbarhet preparat:

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-06-02 14:02:28
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-02 13:56:48
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1300
ID/spårnummer: 3286
Giltig fr o m: 2017-06-02 13:56:48
Utskriftsdatum: 2017-06-02

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Atenativ)

Atenativ (registrerad produkt)

- 50 E/mL, Infusionsvätska, lösning

Hållbar: Färdigberedd lösning ska användas inom 12 timmar.

- 500 E, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras i kylskåp. Kan förvaras 1 månad i rumstemperatur.

Övrig information

Den specifika aktiviteten är cirka 3 E/mg protein.

En (1) internationell enhet (E) antitrombinaktivitet motsvarar antitrombin i den mängd som finns i 1 mL normal human plasma.

Beräkningen av erforderlig dos av antitrombin baseras på den empiriska iakttagelsen att 1 E antitrombin/kg kroppsvikt ökar antitrombinaktiviteten i plasma med ca 1 %.

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

Personlig kontakt Maria Magnusson, MD, Spec koagulation- och blödningsrubbningar, ALB

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Antithrombin III, B01AB02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POH5UBF1SVERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-06-02 14:02:28
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-02 13:56:48
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1300
ID/spårnummer: 3286
Giltig fr o m: 2017-06-02 13:56:48
Utskriftsdatum: 2017-06-02

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

