

Paracetamol oralt, rektalt (ex Alvedon, Panodil)

OBS! Olika styrkor och beredningsformer finns.
Överväg dosreduktion om patienten har en leverpåverkan eller är kraftigt dehydrerad.

Administreringsätt

Oralt: Vid dagkirurgi ges första dosen paracetamol oralt 2 timmar före operation eller efter narkosinledningen.

Enteralt i sond: Munsönderfallande tabletter och oral lösning går att ge i sond.

"Vanliga" tabletter kan krossas och pulvret dispergeras i vatten.

Brustabletter löser upp sig omedelbart i en liten volym vatten.

Rektalt: Suppar ska inte delas

Vanlig indikation och dos

Neo: Smärta och feber (oralt eller rektalt)

Reducera dygnsdosen med 25% efter 2 - 3 dygn.

Laddningsdos:

Under 28 veckor: 15 - 20 mg/kg

28 - 32 veckor: 20 mg/kg

33 - 36 veckor: 20 - 30 mg/kg

37 veckor - 2 mån postnatal ålder: 30 mg/kg

Underhållsdos:

Under 28 veckor: 10 - 15 mg/kg x 2

28 - 32 veckor: 15 mg/kg x 2, max 40 mg/kg/dygn

33 - 36 veckor: 20 mg/kg x 3, max 60 mg/kg/dygn

37 veckor - 2 mån postnatal ålder: 20 - 25 mg/kg x 3, max 90 mg/kg/dygn

Barn: Feber (oralt eller rektalt)

15 mg/kg x 4

max 75 mg/kg/dygn eller 4000 mg/dygn

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-06-30 10:23:17

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-06-30 11:11:23

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1305

ID/spårnummer: 1351

Giltig fr o m: 2016-06-30 11:11:23

Utskriftsdatum: 2016-06-30

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Paracetamol oralt, rektalt (ex Alvedon, Panodil)

Barn: Smärta (oralt)

Reducera dygnsdosen med 25% efter 2 - 3 dygn.

Laddningsdos:

Barn 0 - 2 mån: 30 mg/kg

Barn över 2 mån: 30 - 40 mg/kg

Smärtdos - Underhållsdos:

Barn 0 - 2 mån: 20 - 25 mg/kg x 3

Barn över 2 mån: 25 mg/kg x 4

Maxdos till barn under 50 kg 100 mg/kg/dygn

Maxdos till barn över 50 kg 4000mg/dygn

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mg/kg/dos oral lös	0,04 mL	0,2 mL	0,4 mL	2 mL
10 mg/kg/dos oral lös	0,42 mL	2,1 mL	4,2 mL	20,8 mL
20 mg/kg/dos oral lös	0,08 mL	0,4 mL	0,8 mL	4 mL
20 mg/kg/dos oral lös	0,83 mL	4,2 mL	8,3 mL	41,7 mL
30 mg/kg/laddn.dos		0,6 mL	1,2 mL	6 mL
30 mg/kg/laddn.dos		6,2 mL	12,5 mL	62,5 mL

Hållbarhet preparat:

Paracetamol (ex Alvedon/Panodil) (Registrerad Produkt)

● 24 mg/mL, Oral lösning

Hållbar: Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån

Övrig information

Överväg dosreduktion om patienten har en leverpåverkan eller är kraftigt dehydrerad.

Överdoserings av paracetamol med modifierad frisättning (tabletter 665 mg) är oförutsägbar och standardrutiner för provtagning och behandling är otillräckliga. Kontakta Giftinformationscentralen vid sådana fall.

Detta blad gäller för paracetamolinnehållande preparat, suppositorier (30, 60, 125, 250, 500 mg resp. 1 g), rektalgel (20 mg/mL) tabletter (500 mg resp. 1 g), tabletter med modifierad frisättning (665 mg), munsönderfallande tabletter (250 resp. 500 mg) samt oral lösning (24 mg/mL)

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-06-30 10:23:17

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-06-30 11:11:23

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1305

ID/spårnummer: 1351

Giltig fr o m: 2016-06-30 11:11:23

Utskriftsdatum: 2016-06-30

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Paracetamol oralt, rektalt

(ex Alvedon, Panodil)

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2014-09-29

<https://www.medicinescomplete.com/mc/bnfclegacy/current/>

FASS , Hämtat: 2013-11-14

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Dosering av paracetamol till barn, Hämtat: 2014-09-29

http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/Info_fr_LV_2009-6.pdf

Internetadress Nya riktlinjer vid överdos med Alvedon 665 mg med modifierad frisättning. Läkemedelsverket, Hämtat: 2016-06-30

<https://lakemedelsverket.se//Alla-nyheter/NYHETER-2016/Nya-riktlinjer-vid-overdos-med-Alvedon-665-mg-med-modifierad-frisattning/>

Pediatric Dosage Handbook , Hämtat: 2014-09-29

Rekommendation ,(Grade 1B), Hämtat: 2014-09-29

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Internetadress Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård - kunskapsdokument, Hämtat: 2016-01-26

<http://eped.se/referenser>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2016-01-26

<http://eped.se/referenser>

Substansspecifika uppgifter

Paracetamol, N02BE01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POC2U97HOVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-06-30 10:23:17

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-06-30 11:11:23

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1305

ID/spårnummer: 1351

Giltig fr o m: 2016-06-30 11:11:23

Utskriftsdatum: 2016-06-30

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

