

Paracetamol oral lösning 24 mg/mL (ex Alvedon, Panodil)

Överväg dosreduktion om patienten har en leverpåverkan eller är kraftigt dehydrerad.

Administreringsätt

Oralt: Vid dagkirurgi ges första dosen paracetamol oralt 2 timmar före operation eller efter narkosinledningen.

Enteralt i sond: Oral lösning går att ge i sond.

Vanlig indikation och dos

Neo: Smärta och feber

Reducera dygnsdosen med 25% efter 2 - 3 dygn.

Laddningsdos:

Under 28 veckor: 15 - 20 mg/kg

28 - 32 veckor: 20 mg/kg

33 - 36 veckor: 20 - 30 mg/kg

37 veckor - 2 mån postnatal ålder: 30 mg/kg

Underhållsdos:

Under 28 veckor: 10 - 15 mg/kg x 2

28 - 32 veckor: 15 mg/kg x 2, max 40 mg/kg/dygn

33 - 36 veckor: 20 mg/kg x 3, max 60 mg/kg/dygn

37 veckor - 2 mån postnatal ålder: 20 - 25 mg/kg x 3, max 90 mg/kg/dygn

Barn: Feber

15 mg/kg x 4

max 75 mg/kg/dygn eller 4000 mg/dygn

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-09-15 14:06:40

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-20 14:03:26

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1305

ID/spårnummer: 1513

Giltig fr o m: 2016-09-20 14:03:26

Utskriftsdatum: 2016-09-20

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Paracetamol oral lösning 24 mg/mL (ex Alvedon, Panodil)

Barn: Smärta

Reducera dygnsdosen med 25% efter 2 - 3 dygn.

Laddningsdos:

Barn 0 - 2 mån: 30 mg/kg

Barn över 2 mån: 30 - 40 mg/kg

Smärtdos - Underhållsdos:

Barn 0 - 2 mån: 20 - 25 mg/kg x 3

Barn över 2 mån: 25 mg/kg x 4

Maxdos till barn under 50 kg: 100 mg/kg/dygn

Maxdos till barn över 50 kg: 4000mg/dygn

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mg/kg/dos oral lös	0,42 mL	2,1 mL	4,2 mL	20,8 mL
20 mg/kg/dos oral lös	0,83 mL	4,2 mL	8,3 mL	41,7 mL
30 mg/kg/laddn.dos		6,2 mL	12,5 mL	62,5 mL

Hållbarhet preparat:

Paracetamol (ex Alvedon/Panodil) (Registrerad Produkt)

24 mg/mL, Oral lösning

Hållbar: Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2014-09-29

<https://www.medicinescomplete.com/mc/bnfclegacy/current/>

FASS , Hämtat: 2013-11-14

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Dosering av paracetamol till barn, Hämtat: 2014-09-29

http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/Info_fr_LV_2009-6.pdf

Pediatric Dosage Handbook , Hämtat: 2014-09-29

Rekommendation ,(Grade 1B), Hämtat: 2014-09-29

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Internetadress Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård - kunskapsdokument, Hämtat: 2016-01-26

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-09-15 14:06:40

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-20 14:03:26

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1305

ID/spårnummer: 1513

Giltig fr o m: 2016-09-20 14:03:26

Utskriftsdatum: 2016-09-20

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Paracetamol oral lösning 24 mg/mL (ex Alvedon, Panodil)

<http://eped.se/referenser>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2016-01-26

<http://eped.se/referenser>

Substansspecifika uppgifter

Paracetamol, N02BE01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POC2U97HOVERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-09-15 14:06:40
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-20 14:03:26
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1305
ID/spårnummer: 1513
Giltig fr o m: 2016-09-20 14:03:26
Utskriftsdatum: 2016-09-20

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

