

## Paracetamol oral lösning 24 mg/mL (ex Alvedon, Panodil)

Överväg dosreduktion om patienten har en leverpåverkan eller är kraftigt dehydrerad.

---

### Administreringsätt

Oralt: Vid dagkirurgi ges första dosen paracetamol oralt 2 timmar före operation eller efter narkosinledningen.

Enteralt i sond: Oral lösning går att ge i sond.

---

### Vanlig indikation och dos

#### Neo: Smärta och feber

#### Reducera dygnsdosen med 25% efter 2 - 3 dygn.

Laddningsdos:

Under 28 veckor: 15 - 20 mg/kg

28 - 32 veckor: 20 mg/kg

33 - 36 veckor: 20 - 30 mg/kg

37 veckor - 2 mån postnatal ålder: 30 mg/kg

Underhållsdos:

Under 28 veckor: 10 - 15 mg/kg x 2

28 - 32 veckor: 15 mg/kg x 2, max 40 mg/kg/dygn

33 - 36 veckor: 20 mg/kg x 3, max 60 mg/kg/dygn

37 veckor - 2 mån postnatal ålder: 20 - 25 mg/kg x 3, max 90 mg/kg/dygn

#### Barn: Feber

15 mg/kg x 4

max 75 mg/kg/dygn eller 4000 mg/dygn

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-11-11 13:27:44

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-11-11 13:27:40

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1305

ID/spårnummer: 1708

Giltig fr o m: 2016-11-11 13:27:40

Utskriftsdatum: 2016-11-11

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Paracetamol oral lösning 24 mg/mL

(ex Alvedon, Panodil)

### Barn: Smärta

#### Reducera dygnsdosen med 25% efter 2 - 3 dygn.

Laddningsdos:

Barn 0 - 2 mån: 30 mg/kg

Barn över 2 mån: 30 - 40 mg/kg

Smärtdos - Underhållsdos:

Barn 0 - 2 mån: 20 - 25 mg/kg x 3

Barn över 2 mån: 25 mg/kg x 4

Maxdos till barn under 40 kg: 100 mg/kg/dygn

Maxdos till barn över 40 kg: 4000 mg/dygn

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mg/kg/dos oral lös	0,42 mL	2,1 mL	4,2 mL	20,8 mL
20 mg/kg/dos oral lös	0,83 mL	4,2 mL	8,3 mL	41,7 mL
30 mg/kg/laddn.dos		6,2 mL	12,5 mL	62,5 mL

### Hållbarhet preparat:

Paracetamol (ex Alvedon/Panodil) (registrerad produkt)

24 mg/mL, Oral lösning

Hållbar: Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån

### Referens/Länk

BNF-C

<https://www.medicinescomplete.com/mc/bnflegacy/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Dosering av paracetamol till barn

[http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/info\\_fr\\_LV\\_2009-6.pdf](http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/info_fr_LV_2009-6.pdf)

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1B)

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### Substansspecifika uppgifter

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-11-11 13:27:44

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-11-11 13:27:40

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1305

ID/spårnummer: 1708

Giltig fr o m: 2016-11-11 13:27:40

Utskriftsdatum: 2016-11-11

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## **Paracetamol oral lösning 24 mg/mL** (ex Alvedon, Panodil)

Paracetamol, N02BE01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POC2U97HOVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-11-11 13:27:44  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-11-11 13:27:40  
Källa: [www.eped.se](http://www.eped.se)  
Kontakt: [barnlakemedel@karolinska.se](mailto:barnlakemedel@karolinska.se)

Läkemedelsnummer: 1305  
ID/spårnummer: 1708  
Giltig fr o m: 2016-11-11 13:27:40  
Utskriftsdatum: 2016-11-11

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

