



Natriumvätekarbonat/Natriumbikarbonat oralt 50 mg/mL

(Extempore) oral lösning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Natriumvätekarbonat APL oral lösning 50 mg/mL = 0,6 mmol/mL

ADMINISTRERINGSSÄTT

Basisk lösning. Kan påverka stabilitet och absorption av andra läkemedel. Bör, om möjligt, ges med 1 - 2 timmars intervall till andra orala läkemedel.

Oralt

Enteralt i sond

ÖVRIG INFORMATION

50 mg/mL = 0,6 mmol/mL HCO₃⁻ och 0,6 mmol/mL Na⁺

Överkorrigera ej, risk för övervätskning ökar vid svår njursvikt.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Natriumvätekarbonat (extempore - ej lagervara)

50 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: 1 vecka i rumstemperatur efter första uttag. Lösningen innehåller inget konserveringsmedel, men har egen antimikrobiell effekt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Metabol acidosis

Nyfödda: 0,25 mmol/kg x 6 - 8

Barn: 0,25 - 1 mmol/kg x 2 - 4, max 2 mmol/kg/dygn

Hyponatremi vid samtidig metabol acidosis - behandling eller förebyggande

Nyfödda: 0,25 - 2 mmol/kg x 2 - 4, max 4 mmol/kg/dygn

RIMLIG DOS FÖR 50 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,25 mmol/kg	0,42 mL	2,1 mL	4,2 mL	21 mL
1 mmol/kg	1,66 mL	8,3 mL	16,6 mL	83 mL

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress South Australian Neonatal Medication Guidelines: sodium bicarbonate

https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/52a9ab004cd7f6aabb1abba496684d9f/Sodium%2BBicarbonate_Neo_v2_0.pdf?MOD=AJPERES&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sil.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1316

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-08-27

ePedID: 1316

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-09-05

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-09-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT