



## Naloxon oralt 10 mikrog/mL

(Extempore) oral lösning

Flera styrkor och administreringssätt kan finnas.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Naloxon APL (extempore - ej lagervara)

10 mikrog/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars se utgångsdatum

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Opioidinducerad förstoppning

Startdos 2 - 3 (- 4) mikrog/kg x 4

Dosen kan dubblas varannan dag till 15 mikrog/kg och dos. Det finns vid enskilda tillfällen behov av högre doser.

Överväg andra läkemedel som Relistor eller Moventig till patienter som inte har tillräcklig effekt av naloxonmixtur.

### RIMLIG DOS FÖR 10 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mikrog/kg	0,2 mL	1 mL	2 mL	10 mL
4 mikrog/kg	0,4 mL	2 mL	4 mL	20 mL
15 mikrog/kg	1,5 mL	7,5 mL	15 mL	75 mL

### REFERENS/LÄNK

Internetadress APL, Apotekens Produktion och Laboratorier

<http://www.apl.se>

Internetadress Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser>

Internetadress Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård: Riktlinjer för smärtbehandling hos barn-akut och postoperativ smärta

<https://sfai.se/riktlinje/medicinska-rad-och-riktlinjer/anestesi/smartlindring-av-barn/>

Rekommendation , (Grade 2D)

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-02-13 13:44:59

ePedID: 1319

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-14 10:37:49

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-02-14 10:37:49

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**