

Nystatin oralt 100 000 E/mL

(Nystimex, fd Mycostatin) oral suspension

Administreringsätt

Oralt: Skaka flaskan väl före användning.

Födointag ska undvikas 5 - 10 min efter administrering. Förslagsvis bör suspensionen tas efter måltid.

Suspensionen kan appliceras med svabb. Alternativt ges suspensionen droppvis eller späds med vatten. Ska hållas kvar i munnen så länge som möjligt innan den sväljs.

Vanlig indikation och dos

Oral svampinfektion

Nyfödda: 0,5 - 1 mL på insidan av båda kinderna x 4.

Barn 1 mån - 18 år: 1 - 3 mL på insidan av båda kinderna x 4.

Fortsätt behandlingen 2 - 3 dagar efter att symtomen försvunnit.

Hållbarhet preparat:

Nystatin (Nystimex) (registrerad produkt)

● 100000 E/mL, Oral suspension

Hållbar: Öppnad flaska förvaras i kylskåp. Öppnad flaska förvaras i kylskåp eller rumstemperatur (högst 25 °C) i högst 1 månad.

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-07-11 08:22:30

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-21 15:35:29

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1321

ID/spårnummer: 3567

Giltig fr o m: 2017-08-21 15:35:29

Utskriftsdatum: 2017-08-23

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Nystatin oralt 100 000 E/mL

(Nystimex, fd Mycostatin) oral suspension

Substansspecifika uppgifter

Nystatin, A07AA02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancetid=IDE4POCMU9NLYVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-07-11 08:22:30
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-21 15:35:29
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1321
ID/spårnummer: 3567
Giltig fr o m: 2017-08-21 15:35:29
Utskriftsdatum: 2017-08-23

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

