



Simetikon oralt 100 mg/mL

(Minifom) droppar

ADMINISTRERING

Skaka flaskan väl innan varje uttag av dos. Ges före mat.

Oralt

Enteralt:

Mycket trögflytande. Kan orsaka stopp om dropparna blandas med näringslösning.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Minifom (registrerad produkt)

100 mg/mL, Orala droppar, emulsion

Oöppnad flaska förvaras kallt eller svalt (2 - 15 °C). Öppnad flaska är hållbar 1 mån och kan förvaras i rumstemperatur eller kylskåp under användningstiden.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Spädbarnskolik (låg evidens)

Nyfödda: 10 droppar före måltid, max 80 droppar per dygn

Barn 1 mån - 1 år: 10 droppar före måltid, max 80 droppar per dygn

10 droppar = 0,3 mL

Behandlingen bör pågå under ett par dygn innan effekten utvärderas.

ÖVRIG INFORMATION

Simetikon är detsamma som dimetikon + kolloidal kiseldioxid.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

PubMed PMID Biagioli et al. Pain-relieving agents for infantile colic (2016)

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27631535>

PubMed PMID Hall B et al. Infantile colic: a systematic review of medical and conventional therapies.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21470331>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 1325

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-10-20

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT