



Dimetikon oralt 100 mg/mL

(Minifom) droppar

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Skaka flaskan väl innan uttag. Ges före mat.

Enteralt i sond: Mycket trögflytande, flödar trögt i sond.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Minifom (registrerad produkt)

100 mg/mL, Orala droppar, emulsion

HÅLLBAR: Förvaras kallt eller svalt (2 - 15 °C).

Kan förvaras i rumstemperatur under användningstiden, upp till en månad.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Spädbarnskolik (låg evidens)

Nyfödda: 10 droppar före måltid, max 80 droppar per dygn

Barn 1 mån - 1 år: 10 droppar före måltid, max 80 droppar per dygn

10 droppar = 0,3 mL

Behandlingen bör pågå under ett par dygn innan effekten utvärderas.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

PubMed PMID Hall B et al. Infantile colic: a systematic review of medical and conventional therapies.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21470331>

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-03-06

ePedID: 1325

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-03-07

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-03-07

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT