

ADRENALIN, IV inf
epinephrin 1 mikrog/ml
enl spädn-instruktion

OBS Flera styrkor finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

<i>inj lösn</i>			<i>IV inf</i>
0,1 mg/ml		glukos 50 mg/ml	1 mikrog/ml
0,5 ml	+	50 ml	= 50,5 ml

Beredningsinstruktion: OBS! SPÄDES FRÅN Adrenalin Martindale som ersätter Adrenalin APL. Styrkan på förpackningen är 0,1 mg/ml (vilket motsvarar förpackningsinformationen 1:10,000 = 1 mg in 10 ml = 0,1 mg/ml).

Spädes vidare till 1 mikrog/ml = 0,001 mg/ml.

Administrering: Kontin inf

Hållbarhet efter iordningställande: Resterande lösning får ej sparas.
Hållbarhet originalförp: Förvaras i originalförpackningen. Sparas ej efter första uttag. Ljuskänsligt.
Högst 25 C vid förvaring i akutväskor.

Källa: ATL

Obs: Allergent läkemedel, hanteras enligt neo läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation: Hypotension

Vanlig dos: 0,1-0,3 (-1) mikrog/kg/min

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för epinephrin 1 mikrog/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
0,1 mikrog/kg/min	3,00 ml/tim	6,00 ml/tim	12,00 ml/tim	18,00 ml/tim
1 mikrog/kg/min	30,00 ml/tim	60,00 ml/tim	120,00 ml/tim	180,00 ml/tim