

ADRENALIN, IV inf  
epinephrin 10 mikrog/ml  
enl spädn-instruktion

**OBS Flera styrkor finns. Kontrollera att rätt instruktion används.**

|                 |   |                 |               |
|-----------------|---|-----------------|---------------|
| <i>inj lösn</i> |   |                 | <i>IV inf</i> |
| 0,1 mg/ml       |   | glukos 50 mg/ml | 10 mikrog/ml  |
| 2 ml            | + | 18 ml           | = 20 ml       |

Beredningsinstruktion: OBS! SPÄDES FRÅN Adrenalin Martindale som ersätter Adrenalin APL. Styrkan på förpackningen är 0,1 mg/ml (vilket motsvarar förpackningsinformationen 1:10,000 = 1 mg in 10 ml = 0,1 mg/ml).

Spädes vidare till 10 mikrog/ml = 0,01 mg/ml.

Administrering: Kontin inf

Hållbarhet efter iordningställande: Resterande lösning får ej sparas.  
Hållbarhet originalförp: Förvaras i originalförpackningen. Sparas ej efter första uttag. Ljuskänsligt.  
Högst 25 C vid förvaring i akutväskor.

Källa: ATL

Obs: Allergent läkemedel, hanteras enligt neo läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation: Hypotension

Vanlig dos: 0,1-0,3 (-1) mikrog/kg/min

| Vanlig dos        | Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för epinephrin 10 mikrog/ml |             |              |              |
|-------------------|---|-------------|--------------|--------------|
|                   | 0,5 kg  | 1 kg        | 2 kg         | 3 kg         |
| 0,1 mikrog/kg/min | 0,30 ml/tim   | 0,60 ml/tim | 1,20 ml/tim  | 1,80 ml/tim  |
| 1 mikrog/kg/min   | 3,00 ml/tim   | 6,00 ml/tim | 12,00 ml/tim | 18,00 ml/tim |