



# Adenosin intravenös inj 5 mg/mL

(Adenosin Life Medical)

Ges under kontinuerlig EKG-övervakning och utrustning för akut HLR ska finnas tillgänglig.

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Adenosin injektionsvätska 5 mg/mL, ges outspädd.  
Denna koncentration lämpar sig för större barn (förslagsvis över 5 kg). För mindre barn behöver Adenosin spädas, se annan instruktion.

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion: så snabb injektion som möjligt, 2 sek antingen i central eller stor perifer ven. Följt av snabb flush med NaCl 9 mg/mL.

Använd helst trevägskran, koppla båda sprutorna samtidigt för att kunna flusha Adenosin först och därefter direkt med 2 - 5 mL NaCl 9 mg/mL.

Bör administreras i så hjärtnära ven som möjligt, vanligtvis i armvecket.

## RIMLIG DOS för Adenosin intravenös inj 5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,05 mg/kg	-	0,05 mL	0,1 mL	0,5 mL
0,1 mg/kg	-	0,1 mL	0,2 mL	1 mL
0,3 mg/kg	-	0,3 mL	0,6 mL	3 mL

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Adenosin Life Medical (registrerad produkt)

5 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Sparas ej efter första uttag.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Avbrytande av supraventrikulär takykardi

Adenosin får endast ges i närvaro av läkare och under kontinuerlig EKG-övervakning.

Barn över 5 kg: Startdos 0,1 mg/kg (max 6 mg), kan upprepas varannan minut med ökning av dosen med 0,1 mg/kg varje gång till effekt eller maxdos på 0,4 mg/kg (max 15 mg).

Om ej omslag på 0,4 mg/kg, kontakta barnkardiolog.

Max 0,5 mg/kg.

Om central ven används ska initiala dosen halveras, dvs 0,05 mg/kg (50 mikrogram/kg). Dosen ökas sedan med 0,05 mg/kg.

## ÖVRIG INFORMATION

Kontakta barnkardiolog angående dosreduktion, om patienten är hjärttransplanterad.

Adenosin får inte förvaras i kyla då det finns risk för utfällning (kristaller). Om kristaller bildats, värm upp lösningen i rumstemperatur tills kristallerna löst upp sig.

Hållbarheten skiljer sig från den som är angiven i FASS och grundas på konsultation av andra farmaceutiska källor.

Vanliga biverkningar: hyperventilation, flush, dyspné, tryckkänsla över bröstet, illamående, takykardi och blodtrycksfall.

Kontraindikation: AV-block grad II eller III patienter med lång QT-tid, sick-sinus syndrom.

Kan interagera med koffein och teofyllamin. Dosen kan behöva anpassas.



# Adenosin intravenös inj 5 mg/mL

(Adenosin Life Medical)



## REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

## LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#3127](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3127)

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-10-26

ePedID: 3127

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-11-03

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-11-03

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**