

Läkemedel för injektion eller infusion

NATRIUMKLORID (från Addex-Natriumklorid), IV inf
natriumklorid 0,5 mmol/ml

enl spädn-instruktion

OBS Stor risk för förväxling. Kontrollera noggrant.

<i>inf konc</i>			<i>IV inf</i>
4 mmol/ml		glukos 50 mg/ml	0,5 mmol/ml
1 ml	+	7 ml	= 8 ml

Beredningsinstruktion: Denna lösning är avsedd ENDAST för korrigerig av hyponatremi och innehåller 0,5 mmol natrium/ml, en koncentration som är flerfaldigt högre än den i TPN-lösningar eller glukoslösning med natriumtillsats för nutrition (vanligen 0,02-0,06 mmol/ml).

Administrering: Max 1 mmol/kg/tim = max 2 ml/kg/tim.

Hållbarhet efter iordningställande: Resterande lösning får ej sparas

Varunummer: 490318, Addex-Natriumklorid 4 mmol/ml, 10 x 20 ml

Källa: FASS

Indikation: Hyponatremi

Vanlig dos: Basbehovet av natrium är 2-8 mmol/kg/d, varierar med gestationsålder, postnatal ålder och diuretikamedicinering; vid hyponatremi görs långsam (12-24 tim) korrigerig av deficit = (135 - aktuellt S-Na) x kg KV x 0,6 (därutöver ska basbehovet täckas). Denna lösning är avsedd ENDAST för korrigerig av hyponatremi och innehåller 0,5 mmol natrium/ml, en koncentration som är flerfaldigt högre än den i TPN-lösningar eller glukoslösningar med natriumtillsats för nutrition (vanligen 0,02-0,06 mmol natrium/ml)

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för natriumklorid 0,5 mmol/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
max 1 mmol/kg/tim (i 8-10 tim)	1,00 ml/tim	2,00 ml/tim	4,00 ml/tim	6,00 ml/tim